

125 *Egretta garzetta* (Ciconiiformes, Ardeidae)

Garceta común. Adulto

NOMBRE VULGAR

Garceta común

NOMBRE CIENTÍFICO*Egretta garzetta* (Linnaeus, 1758)**DESCRIPCIÓN**

55-65 cm. De color blanco; pico oscuro; patas negras con dedos amarillos; en plumaje nupcial con plumas alargadas en el pecho, dorso, escapulares y en la cabeza.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Subphylum Vertebrata**

Animales formados por dos mitades simétricas (simetría bilateral).

Cuerpo no segmentado.

Con esqueleto interno óseo o cartilaginoso, con cráneo y columna vertebral que protegen al sistema nervioso.

Sistema nervioso en posición dorsal.

Clase Aves

Con temperatura constante.

Piel cubierta de plumas,

Mandíbulas con un estuche córneo.

Miembros anteriores convertidos en alas.

Especies ovíparas.

Orden Ciconiiformes

Pico más largo que la cabeza.

Patas largas desprovistas de plumas hasta la mitad inferior de la tibia.

Pies sin membranas interdigitales o si están son muy pequeñas.

Dedo posterior bien desarrollado y al mismo nivel que los anteriores.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Ardeidae**

Pico largo, recto y puntiagudo.

Dedos con una membrana interdigital pequeña entre los dedos mediano y exterior.

Uña del dedo medio pectinada.

Cola con 8-12 plumas.

Ala con 11 primarias, la 11ª diminuta.

En vuelo, con el cuello doblado en "S"

Género *Egretta*. *Egretta garzetta*

Tamaño mediano, menor de 65 cm.

Plumaje blanco.

En periodo nupcial con plumas largas en la cabeza.

Cuello delgado y largo.

Pico de color negro.

Patas con pies amarillos.



Garceta común. Detalle de la cabeza y plumas ornamentales.

ESPECIES SIMILARES

Entre las garzas blancas, podría existir confusión con la garcilla bueyera, que tiene el capirote ocre, el pico amarillo y patas del mismo color que los dedos. La garceta grande es de tamaño mucho mayor (85-102 cm).



Garcilla bueyera: plumaje no nupcial.

DETERMINACIÓN DEL SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación.

125 *Egretta garzetta* (Ciconiiformes, Ardeidae)



DETERMINACIÓN DE LA EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:
 Juveniles similares al adulto pero sin plumas ornamentales; pico marrón; piel desnuda de la cara gris; dedos gris verdosos; plumaje nuevo.
 2º año con plumas de vuelo y cola juveniles; manto y escapulares con plumas ornamentales menos desarrolladas que en los adultos.
 Adulto con plumas ornamentales bien desarrolladas; pico negro; piel desnuda de la cara gris verdosa; dedos amarillos.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Región mediterránea hasta centro de Asia, parte de África y Australia. Especie estival con mayor número de ejemplares en otoño y primavera; es posible verla en todos los pueblos de la Comarca.

ALIMENTACIÓN

Invertebrados grandes y pequeños vertebrados.

REPRODUCCIÓN

Habitualmente en ramas de árboles, pero también entre carrizos, ambos sexos construyen un nido poco denso con ramas y hojas de plantas acuáticas; la puesta es de 3 a 6 huevos incubados por los ambos progenitores durante 24 días; los pollos son atendidos por los dos padres deambulando por los alrededores del nido a los 21 días y siendo capaces de volar a los 35.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Es una especie gregaria que cría en colonias mixtas con otras garzas. No suele separarse mucho de los humedales, donde en lugares sin profundidad permanece inmóvil con el pico apuntando al agua; pese a su gregarismo, muestra agresividad ante sus congéneres cuando éstos se acercan demasiado en los lugares de pesca. Al principio de la estación reproductora, el macho elige un territorio que defiende de otros machos y donde se exhibe ante las hembras; éstas se acercan y se quedan o no dependiendo de sus gustos; una vez formada la pareja es únicamente el nido lo que los mantiene unidos siendo así que, alejados de éste, no se reconocen tratándose como extraños. Fuera de la época de cría forma dormideros comunales, solas o en compañía de garcillas buayeras.

BIBLIOGRAFÍA

Baker, K., 1993. Identification Guide to European Non-Passerines. Ed. BTO. London. 332 pp.

Blasco, J., 2014. *Guía de Aves de Aragón*. Ed. PRAMES. Zaragoza. 319 pp.

Burton, Ph. (1983). *Aves de Europa*. Salvat, Barcelona.

Cramp, S. (dir. ed.) (1977-1994). *The Birds of the Western Palearctic*. Vols. 1-9. Oxford.

Fitter, R. y Fernández-Cruz, M. (directores) (1972). *El libro de las aves de España*. Seleccionaciones del Readers's Digest, Madrid.

Sáez-Royuela, R. (1980). *La guía de Incafo de las aves de la Península Ibérica*. INCAFO, Madrid.

Sampietro, F.J., et al. (2000). *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes*. D.G.A., Zaragoza.

ESTUDIO ANATÓMICO



Garceta común. Primavera. Adulto: diseño de la cabeza



Garceta común. Primavera. Adulto: diseño de la nuca

125 *Egretta garzetta* (Ciconiiformes, Ardeidae)



Garceta común. Primavera. Adulto: diseño del dorso



Garceta común. Primavera. Adulto: diseño del ala