

195 *Lymnocyptes minimus* (Charadriiformes, Scolopacidae)



Agachadiza chica. Adulto

NOMBRE VULGAR

Agachadiza chica

NOMBRE CIENTÍFICO

Lymnocyptes minimus (Brünnich, 1764)

DESCRIPCIÓN

19-22 cm. Cabeza parda, con barras oscuras; parte superior del cuello con pequeñas manchas pardas; dorso oscuro, con reflejos metálicos verdosos y listas longitudinales; pecho claro y muy estriado de pardo; pico pardo, oscuro en la punta.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Subphylum Vertebrata

Animales formados por dos mitades simétricas (simetría bilateral).

Cuerpo no segmentado.

Con esqueleto interno óseo o cartilaginoso, con cráneo y columna vertebral que protegen al sistema nervioso.

Sistema nervioso en posición dorsal.

Clase Aves

Con temperatura constante.

Piel cubierta de plumas,

Mandíbulas con un estuche córneo.

Miembros anteriores convertidos en alas.

Especies ovíparas.

Orden Charadriiformes

Patas sin plumas en la tibia.

Con tres dedos anteriores, el posterior reducido o ausente.

Ala con 11 primarias, la 11ª reducida.

Cola con 12 plumas.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Scolopacidae

Cabeza estrecha y ojos relativamente pequeños.

Picos finos y largos en relación a la cabeza.

Tarso y tibia con escamas alrededor.

Alas largas y puntiagudas, con la 10ª primaria más larga que las demás.

Alas con 15-22 secundarias.

Género *Lymnocyptes*. *Lymnocyptes minimus*

Tamaño menor de 25 cm.

Pico muy largo, de color pardo y más oscuro en la punta.

Cabeza con barras oscuras.

Dorso oscuro, con reflejos verdosos.

Partes inferiores blancas, con pecho estriado de pardo.

Cola sin barreado.



Agachadiza chica. Diseño del capirote.

ESPECIES SIMILARES

Parecida a una agachadiza común, que es de mayor tamaño (25-28 cm) y tiene una lista longitudinal clara en el capirote.



Agachadiza común

195 *Lymnocyptes minimus* (Charadriiformes, Scolopacidae)



DETERMINACIÓN DEL SEXO

No es posible sexar esta especie por el plumaje. El tamaño puede ser un carácter útil en ejemplares extremos: macho con ala mayor de 119 mm; hembra con ala menor de 110 mm.



DETERMINACIÓN DE LA EDAD

La especie no nidifica en la Comarca por lo que, al no haber juveniles, pueden reconocerse únicamente 2 tipos de edad (información proporcionada por Iain Livingstone en comunicación personal):



1º año/2º año invierno sólo en los ejemplares que hayan tenido una muda postjuvenil parcial, con plumas externas de la cola estrechas; primaria más externa con punta aguda; coberteras del ala con bordes castaño pálido; infracoberteras de la cola con mancha oscura en el raquis muy poco nítida (CUIDADO: hay muchos ejemplares que mudan todas las infracoberteras de la cola o lo van haciendo a lo largo del invierno).

Adulto con plumas externas de la cola anchas; primaria más externa con punta redondeada; coberteras del ala con bordes castaño intenso; infracoberteras de la cola con mancha oscura en el raquis bien marcada.



CUIDADO: los ejemplares de 1º año que han realizado una muda postjuvenil completa son indistinguibles de los adultos.




Agachadiza chica. Determinación de la edad. Diseño de la punta de la primaria más externa: arriba adulto; abajo 1º año.



Agachadiza chica. Determinación de la edad. Diseño de las plumas 2ª y 3ª de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.



Agachadiza chica. Determinación de la edad. Diseño de las coberteras del ala: izquierda adulto; derecha 1º año.



Agachadiza chica. Determinación de la edad. Diseño de las plumas más externas de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.

195 *Lymnocyptes minimus* (Charadriiformes, Scolopacidae)



Agachadiza chica. Determinación de la edad. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento paleártico. Es una especie invernante poco común en la Comarca; frecuenta las orillas del Ebro y otros puntos de aguas someras.

ALIMENTACIÓN

Esencialmente invertebrados capturados en el barro, también semillas de plantas ribereñas.

REPRODUCCIÓN

En un hoyo hecho en el suelo y forrado con hierbas, pone 4 huevos que incuba la hembra durante 24 días; los pollos abandonan el nido a las pocas horas de su nacimiento.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Es una especie aún más discreta que la agachadiza común, volando recto cuando se le espanta, sin emitir ningún sonido o uno muy suave y echándose de nuevo sin alejarse mucho. En los días muy fríos de invierno duerme durante el día en un lugar seco y se alimenta por la noche, si no hiela puede descansar y alimentarse en el mismo lugar sin moverse. Se ha calculado que, cuando camina buscando comida, mueve el cuerpo rítmicamente hacia arriba y abajo a un ritmo de 3 veces cada 2 segundos

BIBLIOGRAFÍA

Blasco, J., 2014. *Guía de Aves de Aragón*. Ed. PRAMES. Zaragoza. 319 pp.

Burton, Ph. (1983). *Aves de Europa*. Salvat, Barcelona.

Cramp, S. (dir. ed.) (1977-1994). *The Birds of the Western Palearctic*. Vols. 1-9. Oxford.

Fitter, R. y Fernández-Cruz, M. (directores) (1972). *El libro de las aves de España*. Seleccionaciones del Readers's Digest, Madrid.

Prater, A.J., Marchant, J.H. & Vourinen, J., 1977. *Guide to identification and ageing of Holarctic Waders*. BTO. Norfolk.

Sáez-Royuela, R. (1980). *La guía de Incafo de las aves de la Península Ibérica*. INCAFO, Madrid.


Sampietro, F.J., et al. (2000). *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes*. D.G.A., Zaragoza.

ESTUDIO ANATÓMICO




Agachadiza chica. 1º año



195 *Lymnocyptes minimus* (Charadriiformes, Scolopacidae)





Agachadiza chica. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo 1º año



Agachadiza chica. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha 1º año





Agachadiza chica. Diseño del capriote: izquierda adulto; derecha 1º año



Agachadiza chica. Diseño de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año





Agachadiza chica. Diseño del pecho: arriba adulto; abajo 1º año




Agachadiza chica. Diseño de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año

195 *Lymnocyptes minimus* (Charadriiformes, Scolopacidae)





Agachadiza chica. Adulto: diseño de coberteras del ala




Agachadiza chica. Diseño de las infracoberteras de la cola: arriba izquierda adulto; arriba derecha 1º año con plumas mudadas; abajo izquierda 1º año con las plumas no mudadas



Agachadiza chica. 1º año: diseño de coberteras del ala



Agachadiza chica. Diseño de terciarias: izquierda adulto; derecha 1º año



Agachadiza chica. Adulto: diseño del ala



Agachadiza chica. 1º año: diseño del ala