

290 *Prunella modularis* (Passeriformes, Prunellidae)

Acentor común. Adulto

NOMBRE VULGAR

Acentor común

NOMBRE CIENTÍFICO*Prunella modularis* (Linnaeus, 1758)**DESCRIPCIÓN**

13-15 cm. Cabeza, cuello y pecho grises; dorso pardo con rayas; abdomen blancuzco.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Subphylum Vertebrata**

Animales formados por dos mitades simétricas (simetría bilateral).

Cuerpo no segmentado.

Con esqueleto interno óseo o cartilaginoso, con cráneo y columna vertebral que protegen al sistema nervioso.

Sistema nervioso en posición dorsal.

Clase Aves

Con temperatura constante.

Piel cubierta de plumas,

Mandíbulas con un estuche córneo.

Miembros anteriores convertidos en alas.

Especies ovíparas.

Orden Passeriformes

Pico no ganchudo.

Tibia cubierta de plumas.

Pies sin membranas interdigitales.

Pies con tres dedos dirigidos hacia adelante y uno (pulgares) hacia atrás.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Prunellidae. Género *Prunella***

Pico tirando a cónico en la base, pero alargado y adelgazado en la punta.

Comisura del pico no angulada hacia la base.

Narinas no sobremontadas por cerdas ni cubiertas por el plumaje.

Cola con 12 rectrices.

Prunella modularis

Lados del cuello, garganta y pecho de color gris. Partes dorsales pardo manchado.

10ª primaria más corta que las coberteras primarias.

Ala menor de 80 mm.

Plumas de la cola no moteadas.



Acentor común. Diseño de cabeza, pecho y dorso.

**ESPECIES SIMILARES**

La única especie que muestra esa combinación de dorso rayado y cabeza gris es el acentor alpino, que no se encuentra en la Comarca.

DETERMINACIÓN DEL SEXO

El macho suele más gris plomo en la cabeza y garganta que la hembra, pero la diferencia es tan sutil que no tiene valor como criterio de separación debido al solapamiento.

290 *Prunella modularis* (Passeriformes, Prunellidae)



DETERMINACIÓN DE LA EDAD

Esta especie no nidifica en la Comarca, por lo que pueden reconocerse sólo 2 tipos de edad:

1º año otoño/2º año primavera con contraste entre las plumas nuevas y antiguas del ala (más fácil de ver en las plumas del álula si no ha mudado grandes coberteras); iris pardo-grisáceo; pico con base de la mandíbula inferior más pálida; patas marrón claro; plumas de la cola puntiagudas. CUIDADO: algunos juveniles adquieren ya el tono rojizo del iris a primeros de septiembre.

Adultos con todas las plumas del ala de la misma generación; iris pardo-rojizo; pico oscuro; patas marrón rojizo; plumas de la cola redondeadas.



Acentor común. Determinación de la edad. Color del iris y base del pico: arriba adulto; abajo 1º año



Acentor común. Determinación de la edad. Diseño de la punta de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento europeo. Es una especie invernante común en los sotos que bordean al Ebro.

ALIMENTACIÓN

En verano es fundamentalmente insectívoro consumiendo todo tipo de invertebrados, en invierno complementa su dieta con pequeñas semillas.

REPRODUCCIÓN

En la parte baja de una mata, ambos sexos construyen un voluminoso nido en forma de copa de musgos y hierbas, forrado con lana y pelos en su interior; la puesta es de 3 a 5 huevos incubados sólo por la hembra durante 13 días, volando los pollos a los 12 tras haber sido alimentados por ambos padres; a veces tienen hasta tres puestas.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

De colores discretos, su comportamiento también lo es ya que pasa mucho tiempo en la espesura, donde sólo su reclamo lo delata. Es una especie muy solitaria fuera de la época de reproducción. Se alimenta fundamentalmente en el suelo, por donde se deslizan agachados picoteando suavemente, pero siempre cerca de la espesura protectora. Sólo en época de celo el macho se deja ver ya que canta en posaderos altos, consistiendo el cortejo en persecuciones en el suelo mientras ambos sexos aletean y agitan la cola.

BIBLIOGRAFÍA

Bernis, F., 1965. *Claves de Passeriformes de España*. Cátedra de vertebrados. Facultad de Ciencias de Madrid. Madrid. 36 pp.

Blasco, J., 2014. *Guía de Aves de Aragón*. Ed. PRAMES. Zaragoza. 319 pp.

Burton, Ph. (1983). *Aves de Europa*. Salvat, Barcelona.

Cramp, S. (dir. ed.) (1977-1994). *The Birds of the Western Palearctic*. Vols. 1-9. Oxford.

290 *Prunella modularis* (Passeriformes, Prunellidae)



BIBLIOGRAFÍA

Fitter, R. y Fernández-Cruz, M. (directores) (1972). *El libro de las aves de España*. Selecciones del Readers's Digest, Madrid.

Sáez-Royuela, R. (1980). *La guía de Incafo de las aves de la Península Ibérica*. INCAFO, Madrid.

Sampietro, F.J., et al. (2000). *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes*. D.G.A., Zaragoza.



Acentor común. Diseño del pecho: izquierda adulto; derecha 1º año

ESTUDIO ANATÓMICO



Acentor común. 1º año



Acentor común. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha 1º año



Acentor común. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto; abajo 1º año



Acentor común. Diseño de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año

290 *Prunella modularis* (Passeriformes, Prunellidae)



Acentor común. Adulto: diseño del álula



Acentor común. 1º año: diseño del álula



Acentor común. Adulto: diseño del ala



Acentor común. 1º año: diseño del ala