

300 *Sylvia undata* (Passeriformes, Sylviidae)



Curruca rabilarga. Primavera. Macho

NOMBRE VULGAR

Curruca rabilarga

NOMBRE CIENTÍFICO

Sylvia undata (Boddaert, 1783)

DESCRIPCIÓN

13-14 cm. Dorso de color gris oscuro y partes inferiores vinosas; cola larga, con plumas externas con borde blanco; alas pardo oscuro, con plumas ribeteadas de gris; patas pardo amarillentas; anillo orbital de color rojo; garganta vinosa, con moteado blanco. Los **juveniles** tienen el dorso pardo y partes inferiores pardo-rojizo. Ala entre 48-56 mm.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Subphylum Vertebrata

Animales formados por dos mitades simétricas (simetría bilateral).

Cuerpo no segmentado.

Con esqueleto interno óseo o cartilaginoso, con cráneo y columna vertebral que protegen al sistema nervioso.

Sistema nervioso en posición dorsal.

Clase Aves

Con temperatura constante.

Piel cubierta de plumas,

Mandíbulas con un estuche córneo.

Miembros anteriores convertidos en alas.

Especies ovíparas.

Orden Passeriformes

Pico no ganchudo.

Tibia cubierta de plumas.

Pies sin membranas interdigitales.

Pies con tres dedos dirigidos hacia adelante y uno (pulgar) hacia atrás.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Sylviidae

Plumaje generalmente verdoso, marrón o gris.

Pico delgado y recto.

Con cerdas nasales poco desarrolladas.

Ala con 10 primarias, la 10ª reducida.

Juveniles sin plumaje moteado.

Género *Sylvia*

Pico fino, apenas deprimido en la base y culmen poco curvo.

Cerdas de la comisura del pico poco manifiestas.

Cola rectangular o poco redondeada.

10ª primaria más corta que la mitad de la 9ª primaria.

Con 12 plumas en la cola.

Sylvia undata

Pico bicolor, oscuro con la base de la mandíbula inferior amarillenta.

Plumaje gris oscuro en las partes superiores, pardo vinoso por abajo

Garganta vinosa, con moteado blanco.

Anillo ocular rojo.

Patas pardo amarillento.

Cola proporcionalmente larga (de hasta 68 mm), con blanco en las plumas externas.

10ª primaria igual o mayor que las coberteras primarias.

Ala de 48-56 mm.



Curruca rabilarga. Diseño de cabeza y dorso.



300 *Sylvia undata* (Passeriformes, Sylviidae) 

ESPECIES SIMILARES

El aspecto oscuro, cola larga y garganta vinosa moteada de blanco hacen inconfundible a esta especie.

DETERMINACIÓN DEL SEXO

El macho tiene la cabeza y dorso gris pizarra oscuro; partes inferiores rosa pardo intenso; mentón y garganta rojo vinoso con puntos blancos bien marcados. La hembra tiene la cabeza y dorso pardo gris; partes inferiores ante rosado; mentón y garganta rojo pálido con puntos blancos pequeños y poco marcados. Los juveniles no se pueden sexar.



Curruca rabilarga. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.



Curruca rabilarga. Determinación del sexo. Diseño de cabeza: arriba macho; abajo hembra.



DETERMINACIÓN DE LA EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:
 Juveniles con plumaje nuevo y tonos apagados, sin tinte rojizo en las partes inferiores ni en la garganta; iris oliva-marrón.
 1º año otoño/2º año primavera con contraste en el ala entre las plumas mudadas y las juveniles conservadas; primarias y coberteras primarias marronáceas con borde ante-marrón.
 Adultos con las plumas del ala de la misma generación; primarias y coberteras primarias grises con borde marrón-gris. Iris de color rojizo.
CUIDADO: en primavera, ambos tipos de edad pueden mostrar contraste en el ala entre plumas nuevas y viejas si han realizado muda prenupcial.



Curruca rabilarga. Determinación del sexo. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra.



Curruca rabilarga. Determinación de la edad. Diseño de cabeza y color del iris: arriba adulto hembra; abajo juvenil.



300 *Sylvia undata* (Passeriformes, Sylviidae) 



Curruca rabilarga. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.



Curruca rabilarga. Determinación de la edad. Límite de muda en coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento mediterráneo. Especie sedentaria presente en toda la Comarca; es propia de matorrales en ambientes de secano.

ALIMENTACIÓN

Fundamentalmente invertebrados de pequeño tamaño.

REPRODUCCIÓN

Entre las ramas de un arbusto cerca del suelo, la hembra principalmente construye un nido en forma de copa utilizando raicillas y tallos pequeños de hierba; la puesta es de 3 ó 4 huevos incubados con un esfuerzo mayor por parte de la hembra durante 12 días; los pollos abandonan el nido a los 13 días.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Sin parar un momento y buscando siempre el abrigo de lo más denso del matorral, de la curruca rabilarga se atisba sólo una pequeña bola de plumas con una cola larga que abandona fugaz un arbusto para esconderse en otro. Esta timidez se rompe en época de celo, cuando el macho se exhibe en lo más alto de una rama emitiendo su canto nupcial, siendo entonces extremadamente agresiva con otros congéneres. Esa una especie muy sedentaria, realizando si acaso cortos movimientos trashumantes, por lo que los inviernos muy fríos causan muchas bajas entre estas aves.

BIBLIOGRAFÍA

Bernis, F., 1965. *Claves de Passeriformes de España*. Cátedra de ertebrados. Facultad de Ciencias de Madrid. Madrid. 36 pp.

Blasco, J., 2014. *Guía de Aves de Aragón*. Ed. PRAMES. Zaragoza. 319 pp.

Burton, Ph. (1983). *Aves de Europa*. Salvat, Barcelona.

Cramp, S. (dir. ed.) (1977-1994). *The Birds of the Western Palearctic*. Vols. 1-9. Oxford.

Fitter, R. y Fernández-Cruz, M. (directores) (1972). *El libro de las aves de España*. Selecciones del Readers's Digest, Madrid.

Sáez-Royuela, R. (1980). *La guía de Incafo de las aves de la Península Ibérica*. INCAFO, Madrid.

Sampietro, F.J., et al. (2000). *Aves de Aragón. Atlas de especies nidificantes*. D.G.A., Zaragoza.

300 *Sylvia undata* (Passeriformes, Sylviidae)

ESTUDIO ANATÓMICO



Curruca rabilarga. Primavera. Hembra



Curruca rabilarga. Primavera. Juvenil



Curruca rabilarga. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda macho; arriba derecha hembra; izquierda juvenil



Curruca rabilarga. Primavera. Diseño de la cabeza, anillo ocular y color del iris: arriba macho; centro hembra; abajo juvenil



300 *Sylvia undata* (Passeriformes, Sylviidae) 



Curruca rabilarga. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda macho; arriba derecha hembra; izquierda juvenil



Curruca rabilarga. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho; derecha hembra



Curruca rabilarga. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala



Curruca rabilarga. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho; arriba derecha 2º año hembra; izquierda juvenil



Curruca rabilarga. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala

300 *Sylvia undata* (Passeriformes, Sylviidae) 



Curruca rabilarga. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala



Curruca rabilarga. Otoño. Adulto. Macho



Curruca rabilarga. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala



Curruca rabilarga. Otoño. Adulto. Hembra



Curruca rabilarga. Primavera. Juvenil: diseño del ala



Curruca rabilarga. Otoño. 1º año. Macho

300 *Sylvia undata* (Passeriformes, Sylviidae) 



Curruca rabilarga. Otoño. 1º año. Hembra



Curruca rabilarga. Otoño. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra




Curruca rabilarga. Otoño. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra



Curruca rabilarga. Otoño. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra



Curruca rabilarga. Otoño. 1º año. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra



Curruca rabilarga. Otoño. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra

300 *Sylvia undata* (Passeriformes, Sylviidae) 



Curruca rabilarga. Otoño. 1º año. Hembra



Curruca rabilarga. Otoño. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra



Curruca rabilarga. Otoño. 1º año. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra



Curruca rabilarga. Otoño. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra



Curruca rabilarga. Otoño. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra



Curruca rabilarga. Otoño. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra

300 *Sylvia undata* (Passeriformes, Sylviidae) 



Curruca rabilarga. Otoño. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra



Curruca rabilarga. Otoño. 1º año. Diseño de la cola: izquierda macho; derecha hembra



Curruca rabilarga. Otoño. Adulto. Macho: diseño del ala



Curruca rabilarga. Otoño. Adulto/1º año. Diseño de la cola: izquierda macho; derecha hembra



Curruca rabilarga. Otoño. Adulto. Hembra: diseño del ala

300 *Sylvia undata* (Passeriformes, Sylviidae)  aranzadi
zientzia elkarte



Curruca rabilarga. Otoño. 1º año. Macho: diseño del ala



Curruca rabilarga. Otoño. 1º año. Hembra: diseño del ala