

**048 *Cynoglossum cheirifolium* L.**

Vireta, Pina de Ebro (23/04/2013)

***Cynoglossum cheirifolium* L.****NOMBRE VULGAR**

Viniebla

**DESCRIPCIÓN**

10-30 cm. Hierba con tallos erectos, cubiertos de tomento blanquecino; hojas densamente pellosas por ambas caras, enteras, de forma oblonga; flores de color rosado o rojo, sin venación oscura; mericarpos con el margen diferenciado y prominente..

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Familia Boraginaceae**

Plantas verdes, con clorofila.

Plantas a menudo ásperas al tacto, con indumento setoso-hispido.

Tallo de sección circular.

Flores con cáliz y corola.

Flores frecuentemente irregulares.

Pétalos soldados, al menos en la base.

Cáliz con dientes o lóbulos.

Estambres libres, en número igual o menor al de los pétalos.

Con 5 estambres o más, alternos con los pétalos.

Ovario con base situada más arriba que la envoltura floral.

Fruto con carpelos separados o se abre en varias valvas.

**Género *Cynoglossum*.**

Plantas herbáceas, erectas,

Plantas densamente pelosas.

Hojas superiores alternas,

Corola con el tubo más largo que los lóbulos.

Corola con lóbulos iguales.

Generalmente los estambres no sobresalen de la corola.

Cáliz peloso, con pelos rectos.

Cáliz dividido hasta casi la base,

Núculas con púas.

***Cynoglossum cheirifolium***

Planta cubierta de una pelusa blanquecina.

La mayoría de las flores con brácteas.

Pétalos rojizos, con nervios poco aparentes.

**ESPECIES SIMILARES**

El tomento blanquecino que cubre toda la planta y el color de las flores hacen que no haya confusión posible con ninguna otra especie.

**DISTRIBUCIÓN**

Región mediterránea occidental. Presente en toda la Comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de orillas de caminos y suelos removidos, principalmente en ambientes de secano.

Florece desde abril hasta junio.

**048 *Cynoglossum cheirifolium* L.****AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**

*C. cheirifolium*. Detalle del tallo



*C. cheirifolium*. Detalle de una hoja: envés



*C. cheirifolium*. Detalle de una hoja: haz



*C. cheirifolium*. Detalle de la corola

**048** *Cynoglossum cheirifolium* L.



*C. cheirifolium*. Detalle de la flor



*C. cheirifolium*. Detalle de los mericarpos



*C. cheirifolium*. Detalle de los sépalos