

057 *Paronychia argentea* Lam.

Deslinde, Pina de Ebro (12/05/2013)

***Paronychia argentea* Lam.**

NOMBRE VULGAR

Nevadilla, sanguinaria

DESCRIPCIÓN

10-30 cm. Hierba algo leñosa en la base, con tallos postrados y muy ramificados; hojas con peciolo muy corto, sin pelosidad, con punta aguda; flores agrupadas en grupos globosos, ocultas por las brácteas; sépalos con margen membranoso y banda central castaña, con forma de capucha.



P. argentea. Detalle de los sépalos

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Caryophyllaceae.

Hojas generalmente simples y enteras.

Hojas con estípulas pequeñas.

Flores de dos tipos:

a) con pétalos y sépalos ausentes o escariosos.

b) si los tienen, entonces flores con 4-5 pétalos y sépalos, pétalos libres o ligeramente soldados en la base y ovario súpero.

Frutos en cápsula sin cuernecillos, con 1-2 semillas.

Género *Paronychia*

Brácteas florales de consistencia seca y escariosa, más grandes que las flores.

Hojas opuestas o verticiladas.

Inflorescencias en grupos laterales, axilares o finales.

Flores sin pétalos

Frutos secos con una sola semilla.

Paronychia argentea

Sépalos terminados en una arista o capuchón.

Sépalos con banda central castaña.

ESPECIES SIMILARES

Las brácteas escariosas permiten reconocer con facilidad al género *Paronychia*. *P. argentea* convive en algunos lugares con *Paronychia capitata* (L.) Lam., planta muy parecida pero de aspecto menos verdoso y con sépalos sin banda central castaña y sin forma de capucha.

057 *Paronychia argentea* Lam.*Paronychia capitata***DISTRIBUCIÓN**

Región mediterránea y Canarias. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de orillas de caminos, eriales, pedregales y gravas. Florece desde abril hasta junio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Eremopyreto-Lygeetum
Andryaletum ragusinae

COMENTARIOS Y USOS

Comentar primero que en la medicina popular no se suele distinguir a esta especie de *Paronychia capitata* entendiéndose ambas bajo el término de “nevadilla”. En cocimiento, la nevadilla se utiliza para purificar la sangre en casos de tensión alta; la planta fresca machacada puede aplicarse sobre las heridas ayudando a su encoramiento. En recetarios medievales, estas plantas eran recomendadas para usos tales como, introducida dentro, cerrar la natura de la mujer que no sujeta la simiente del varón, como infusión para evitar el ser sangrado, para combatir la cefalea puesta en la cabeza y cubierta por una toca o, quemada, ponerse encima para que el humo alivie el dolor de las almorranas.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA*P. argentea*. Detalle de la hoja: haz.*P. argentea*. Detalle de la hoja: envés*P. argentea*. Detalle de grupo floral

057 *Paronychia argentea* Lam.

P. argentea. Detalle de grupo floral: vista posterior



P. argentea. Detalle de la flor, sépalos y brácteas.



P. argentea. Detalle de grupo floral con frutos