

**057 *Spergularia diandra* (Guss.) Boiss.**

Trancar, Pina de Ebro, (02/04/2015)

***Spergularia diandra* (Guss.) Boiss.**

**NOMBRE VULGAR**

-

**DESCRIPCIÓN**

5-20 cm. Hierba glabra, esparcidamente pubescente en las inflorescencias. Tallos gráciles, morados o negruzcos. Hojas opuestas, lineares, mucronadas; estípulas lanceoladas, escariosas. Brácteas superiores rudimentarias, casi tapadas por las estípulas; pedicelos erectos. Flores pentámeras. Sépalos ovales, con ancho margen escarioso. Pétalos más cortos que los sépalos, rosados, púrpúreos o violáceos. Cápsula exerta, con 3 valvas, a veces morada en la cara interna. Semillas ápteras, marrones o negras.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**Familia Caryophyllaceae.**

Hojas generalmente simples y enteras.

Hojas con estípulas pequeñas.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Familia Caryophyllaceae.**

Flores de dos tipos:

- a) con pétalos y sépalos ausentes o escariosos.
- b) si los tienen, entonces flores con 4-5 pétalos y sépalos, pétalos libres o ligeramente soldados en la base y ovario súpero.

Frutos en cápsula sin cuernecillos, con 1-2 semillas.

**Género *Spergularia***

Hojas con estípulas escariosas.

Hojas opuestas, generalmente lineares.

Pistilos con 3 estilos.

Sépalos libres o apenas soldados en la base.

Frutos en cápsula, dehiscentes por 3 valvas.

***Spergularia diandra***

Hierbas erguidas, no lignificadas en la base.

Flores rosadas, pequeñas (2-3 mm), largamente pedunculadas, desprovistas de brácteas.

Pétalos más cortos que los sépalos.

Brácteas superiores ausentes o muy reducidas ocultas por la estípulas

Estípulas soldadas solamente en la base.

Semillas no aladas.



*S. diandra*. Diseño de la flor

**ESPECIES SIMILARES**

La combinación de tallos ascendentes no radicales, flores rosadas pequeñas largamente pedunculadas con los pétalos más cortos que los sépalos y brácteas superiores ausentes o muy reducidas ocultas por la estípulas diferencian a esta especie de las demás del género *Spergularia*.

**057 *Spergularia diandra* (Guss.) Boiss.****DISTRIBUCIÓN**

Elemento eurocircunmediterráneo. Presente en toda la Comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de pastizales en suelos algo salinos no muy secos. Florece desde abril hasta junio.

**RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS**

*Agropyro cristati-Lygeetum sparti*  
*Aizooeto hispanici-Suaedetum splendidis*  
*Lygeo sparti-Stipetum lagascae*  
*Onopordetum nervosi*  
*Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae*  
*Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae*  
*Suaedetum verae*

**FAUNA ASOCIADA**

*Sibinia arenariae* (Coleoptera). Planta nutricia

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**

*S. diandra*. Detalle de la estípula



*S. diandra*. Detalle de hojas y tallo



*S. diandra*. Detalle de la flor

**057 *Spergularia diandra* (Guss.) Boiss.**



*S. diandra*. Detalle de la corola



*S. diandra*. Detalle del fruto



*S. diandra*. Detalle de los sépalos



*S. diandra*. Detalle del fruto