

061 *Atriplex prostrata* Boucher ex DC.

Los Nidos, Pina de Ebro (20/08/2013)

***Atriplex prostrata* Boucher ex DC**

NOMBRE VULGAR

Acelga falsa

DESCRIPCIÓN

20-80 cm. Hierba de tallos erectos a postrados, con estrías verdosas; hojas todas con peciolo, las superiores lanceoladas, las inferiores triangulares, con los lóbulos laterales dirigidos hacia la base foliar; inflorescencia sin hojas; bractéolas con forma de rombo, sólo soldadas en la base, frecuentemente con tubérculos en el dorso.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Chenopodiaceae

Hojas simples, sin estípulas, a veces crasas o inaparentes.

Flores con piezas poco vistosas, con perianto sepaloideo rodeado generalmente por una envoltura de 5 piezas.

Flores con gineceo súpero.

Flores con igual o menor número de estambres que de piezas del perianto.

Frutos con una semilla.

Género *Atriplex*

Plantas sin vellosidad o cubiertas si acaso de pequeñas vesículas blancas que les dan un aspecto farinoso.

Hojas con limbo bien desarrollado.

Flores unisexuales, desnudas o con dos brácteas que semejan sépalos.

Frutos rodeados de dos brácteas triangulares o redondeadas, libres o soldadas en su parte inferior.

Atriplex prostrata

Plantas herbáceas.

Hojas más o menos verdes.

Hojas triangulares con los lóbulos laterales dirigidos hacia la base de la hoja.

Bractéolas que rodean al fruto soldadas sólo en la base, no endurecidas.



A. prostrata.
Detalle de los lóbulos laterales dirigidos hacia la base.

ESPECIES SIMILARES

Dos especies herbáceas más del género *Atriplex* están presentes en la Comarca: *Atriplex patula*, que tiene las hojas con los lóbulos de la base dirigidos hacia el ápice y *Atriplex rosea*, con las hojas blanquecinas.

061 *Atriplex prostrata* Boucher ex DC.

A. patula. Detalle de la planta y la hoja con lóbulos laterales dirigidos hacia el ápice.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos algo húmedos en los sotos y orillas de caminos en ambientes de regadío; también en lugares salinizados. Florece desde julio hasta octubre.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae
Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae
Soncho-Juncetum maritimi
Suaedetum verae
Trifolieto-Cynodontetum

COMENTARIOS Y USOS

Las hojas tiernas se han consumido crudas en ensaladas y hervidas como verduras

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

A. rosea. Detalle de la planta y de la hoja




A. prostrata. Detalle del tallo

DISTRIBUCIÓN

Europa, norte de África, suroeste de Asia y norte de América. Presente en toda la Comarca.

061 *Atriplex prostrata* Boucher ex DC.



A. prostrata. Detalle de hoja superior



A. prostrata. Detalle de hoja inferior: envés



A. prostrata. Detalle de hoja inferior: haz



A. prostrata. Detalle de rama con inflorescencias

061 *Atriplex prostrata* Boucher ex DC.



A. prostrata. Detalle de inflorescencia



A. prostrata. Detalle de rama con frutos



A. prostrata. Detalle de rama con frutos



A. prostrata. Detalle de las bractéolas de fruto

061 *Atriplex prostrata* Boucher ex DC.



A. prostrata. Detalle de las bractéolas de fruto