

062 *Fumana ericoides* (Cav.) Gand.



Agudicos, Pina de Ebro (12/05/2013)

***Fumana ericoides* (Cav.) Gand.**

NOMBRE VULGAR

Sillerilla

DESCRIPCIÓN

20-40 cm. Planta de tallos erectos, gruesos. Hojas alternas, dispuestas densamente, sésiles, sin estípulas, lineares. Flores pentámeras, solitarias; pedicelos más largos que las hojas, patentes en la fructificación; sépalos glabrescentes, no ciliados; pétalos amarillos. Cápsula caduca; valvas abiertas y patentes tras la dehiscencia. Semillas hasta 9 por cápsula, finamente tuberculadas, de color pardo oscuro.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Cistaceae

Hojas enteras.

Flores con al menos algunos pétalos libres.

Flores con estambres numerosos y filamentos libres entre sí, en número superior al doble de los pétalos.

Gineceo súpero, con varios carpelos y un estilo único.

Género *Fumana*

Plantas leñosas.

Hojas siempre lineares.

Pétalos amarillos.

Estilos alargados.

Estambres periféricos de las flores no terminados en anteras.

Cápsulas con tres valvas.

Fumana ericoides

Tallos erectos, gruesos.

Hojas alternas, sin estípulas, rectas, subcilíndricas, no ciliadas, obtusas.

Flores solitarias entre hojas no bracteiformes, con hojas entre las flores.

Sépalos y pedicelos glabrescentes, no ciliados.

Pedicelos patentes, arqueados en la fructificación, persistentes tras la caída del fruto.



F. ericoides.
Detalle de la flor y las hojas.

062 *Fumana ericoides* (Cav.) Gand.**ESPECIES SIMILARES**

La combinación de tallos erectos gruesos, hojas rectas, subcilíndricas, no ciliadas, obtusas, mucronuladas y sépalos y pedicelos glabrescentes, no ciliados diferencian a esta especie de las demás del género *Fumana*.

DISTRIBUCIÓN

Elemento circunmediterráneo. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de matorrales abiertos en lugares soleados. Florece desde abril hasta junio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Helianthemetum squamati

Ononidetum tridentatae

Rhamno lycioides-Quercetum cocciferae

Rosmarino officinali-Linetum suffruticosi

Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi

COMENTARIOS Y USOS

En algunos lugares de Huesca un emplaste hecho con los frutos machacados aplicados en el costado se utilizaba para aplacar el cólico de riñón; en Andalucía también, con efectos diuréticos, se tomaba la infusión de flores.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

F. ericoides. Detalle de rama con flores



F. ericoides. Detalle de las hojas



F. ericoides. Detalle de la flor



F. ericoides. Detalle de la corola

062 *Fumana ericoides* (Cav.) Gand.



F. ericoides. Detalle del cáliz



F. ericoides. Detalle de cápsula abierta



F. ericoides. Detalle de cápsula inmadura



F. ericoides. Detalle de cápsula abierta



F. ericoides. Detalle de cápsula cerrada



F. ericoides. Detalle de cápsula abierta con semillas

062 *Fumana ericoides* (Cav.) Gand.



F. ericoides. Detalle de cápsula abierta sin semillas