

064 *Arctium minus* Bernh.

Vireta, Pina de Ebro (20/07/2013)

***Arctium minus* Bernh.**

NOMBRE VULGAR

Lampazo

DESCRIPCIÓN

50-150 cm. Hierba con tallos erectos, generalmente ramificados desde la base, con abundante vellosidad; hojas con peciolo, las inferiores muy grandes (hasta 42 cm), las superiores de menor tamaño; capítulos solitarios o en grupos de 2-10; involucre globoso; corola de color generalmente rosado; frutos de color castaño; vilano blanco amarillento.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Compositae**

Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas, sin estípulas.

Hojas con espinas o inermes.

Flores sentadas, en capítulos rodeados por brácteas (involucro).

Pétalos soldados en su base y a veces en sus partes superiores.

Gineceo ínfero.

Estambres inapreciables o soldados por las anteras.

Cáliz transformado en un vilano generalmente formado por pelos, escamas o setas o ausente.

Fruto seco monospermo.

Género *Arctium*. *Arctium minus*

Plantas elevadas, de hojas muy grandes (varios dm) y sin espinas.

Hojas enteras.

Flores con involucre con ganchos muy adherentes, apenas sobrepasado por las flores.

Brácteas del involucre imbricadas en varios niveles.

ESPECIES SIMILARES

Las hojas inferiores tan grandes y las brácteas del involucre tan adherentes diferencian a esta especie de las demás Compositae.

DISTRIBUCIÓN

Europa, Suroeste de Asia, Macaronesia y Norte de África; aparece naturalizada en otras regiones del planeta. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos húmedos de los sotos y otros lugares como orillas de caminos o acequias, principalmente en ambientes de regadío. Florece desde julio hasta septiembre.

064 *Arctium minus* Bernh.**COMENTARIOS Y USOS**

Las hojas tiernas, los tallos y los capítulos pueden consumirse como verdura. En el Alto Aragón se han recogido varios usos medicinales de esta planta: el cocimiento de la raíz se utilizaba en uso interno contra la gota y, para detener la calvicie, lavándose la cabeza con el caldo resultante, los vapores del cocimiento de las hojas para desinflamar almorranas, los cólicos intestinales se trataban frotando el vientre con los capítulos tostados mezclados con manteca, el reverso de la hoja, quitándole la pelusilla, era utilizado para desinfectar y curar heridas, las hojas, pasadas al rescoldo y mezcladas con manteca de cerdo, eran utilizadas para rebajar la fiebre de los niños, entre otros usos.



A. minus. Detalle de hoja superior: haz

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

A. minus. Detalle del tallo



A. minus. Detalle de hoja superior: envés



A. minus. Detalle de hoja inferior: haz

064 *Arctium minus* Bernh.



A. minus. Detalle de hoja inferior: envés



A. minus. Detalle del capítulo floral juvenil



A. minus. Detalle del capítulo floral juvenil



A. minus. Detalle de rama con capítulos



A. minus. Detalle del capítulo floral

064 *Arctium minus* Bernh.



A. minus. Detalle de las flores



A. minus. Detalle del capítulo maduro



A. minus. Detalle de las brácteas



A. minus. Detalle del capítulo con aquenios



A. minus. Detalle de rama con capítulos maduros