


064 *Cirsium vulgare* (Savi) Ten.

El Llano, Pina de Ebro (04/07/2013)

***Cirsium vulgare* (Savi) Ten.**

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

50-180 cm. Hierba de tallos erectos, alados en casi toda su longitud, ramificados en el tercio o en la mitad superior. Hojas alternas, con segmentos estrechamente triangulares, de envés tomentoso, con espinas en el haz y espinas marginales robustas; las inferiores pecioladas, las medias sésiles, largamente decurrentes. Involucro ovoideo; brácteas de ápice erecto, con espina terminal. Flores purpúreas, con limbo dividido hasta la mitad o poco más. Vilano caedizo, de pelos plumosos soldados en la base.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Compositae**

Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas, sin estípulas.

Hojas con espinas o inermes.

Flores sentadas, en capítulos rodeados por brácteas (involucro).

Pétalos soldados en su base y a veces en sus partes superiores.

Gineceo ínfero.

Estambres inapreciables o soldados por las anteras.

Cáliz transformado en un vilano generalmente formado por pelos, escamas o setas o ausente.

Fruto seco monospermo.

Género *Cirsium*

Hojas con espinas,

Hojas alternas, uniformemente verdes en el haz, sin nervaduras blancas.

Brácteas del involucro diferentes a las hojas.

Frutos con vilano formador por pelos plumosos.

Cirsium vulgare

Tallo alado y espiniscente.

Hojas no decurrentes, con pelos rígidos en el haz.

Limbo de la corola dividido hasta la mitad.




C. vulgare. Hojas no decurrentes, con pelos rígidos en el haz; tallo alado.

064 *Cirsium vulgare* (Savi) Ten.



ESPECIES SIMILARES

De las especies del género *Cirsium* citadas en la Comarca con hojas con pelos rígidos en el haz, solo se encuentra *C. echinatum*, que tiene tallo no alado y brácteas involucrales curvadas hacia afuera.



C. echinatum.
Hojas con pelos rígidos en el haz; tallo no alado; brácteas involucrales curvadas hacia afuera.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



C. vulgare. Detalle del tallo



C. vulgare. Detalle de hoja superior: haz



C. vulgare. Detalle de hoja superior: envés

DISTRIBUCIÓN

Elemento paleotemplado. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Acompañante de las plantas que aparecen en campos de regadío, lindes y terrenos húmedos antropizados. Florece desde julio hasta septiembre.

COMENTARIOS Y USOS

Los tallos tiernos pueden consumirse en ensalada y, pelados, como verdura hirviéndolos en agua con sal.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

064 *Cirsium vulgare* (Savi) Ten.




C. vulgare. Detalle de hoja inferior: haz



C. vulgare. Capítulo floral



C. vulgare. Detalle de hoja inferior: envés



C. vulgare. Detalle del capítulo floral



C. vulgare. Detalle del capítulo floral

064 *Cirsium vulgare* (Savi) Ten.



C. vulgare. Capítulo floral maduro



C. vulgare. Capítulo floral maduro



C. vulgare. Capítulo floral maduro