

064 *Conyza canadensis* (L.) Cronq.

Talavera, Pina de Ebro (09/09/2013)

***Conyza canadensis* (L.) Cronq.**

NOMBRE VULGAR

Zamarraga

DESCRIPCIÓN

30-130 cm. Hierba anual, laxamente pubescente; tallos erectos, simples excepto en la inflorescencia; hojas alternas, lineares, enteras o dentadas, con vellosidad sobre todo en el nervio y márgenes; capítulos pedunculados, reunidos en panículas; flores blanquecinas, las externas liguladas; vilano de pelos denticulados.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Compositae

Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas, sin estípulas.

Hojas con espinas o inermes.

Flores sentadas, en capítulos rodeados por brácteas (involucro).

Pétalos soldados en su base y a veces en sus partes superiores.

Gineceo ínfero.

Estambres inapreciables o soldados por las anteras.

Cáliz transformado en un vilano generalmente formado por pelos, escamas o setas o ausente.

Fruto seco monospermo.

Género *Conyza*

Plantas anuales.

Hojas alternas, repartidas a lo largo del tallo.

Capítulos muy numerosos agrupados en panícula densa y alargada.

Ligulas muy pequeñas, apenas aparentes.

Brácteas imbricadas en varias filas.

Frutos con vilano de pelos.

Conyza canadensis

Hojas medias linear-lanceoladas, sólo con el nervio central bien marcado, con largos cilios patentes cerca de la base.

Flores externas con pequeñas ligulas blancas.

Involucro verde, sin vellosidad.

Brácteas involucrales lanceolado-lineares, no ensanchadas en la base.



C. canadensis. Capítulo con flores externas liguladas.

064 *Conyza canadensis* (L.) Cronq.**ESPECIES SIMILARES**

Muy parecida a *Conyza bonariensis* y *Conyza sumatrensis*, más vellosas y con flores externas con lígula filiforme poco apreciable.



C. bonariensis. Capítulo con flores externas con lígulas filiformes.

DISTRIBUCIÓN

Con origen en América del Norte, en la actualidad tiene una distribución subcosmopolita. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos con algo de humedad está presente en orillas de caminos y de campos de cultivo principalmente en ambientes de regadío. Florece desde junio hasta octubre.

COMENTARIOS Y USOS

Planta rica en taninos que puede ser utilizada como astringente y antidiarreica; se usa también como diurético y, al estimular la secreción de ácido úrico, contra la gota y el reuma. Sus hojas están cubiertas por un exudado aceitoso, semejante a la trementina, que repele a los pulgones. El tallo seco se puede utilizar como vara para hacer fuego de fricción.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

C. canadensis. Detalle del tallo



C. canadensis. Detalle del tallo y hojas

064 *Conyza canadensis* (L.) Cronq.



C. canadensis. Detalle de la hoja: haz



C. canadensis. Detalle de la hoja: envés



C. canadensis. Detalle del capítulo floral



C. canadensis. Detalle de las flores



C. canadensis. Detalle de las brácteas

064 *Conyza canadensis* (L.) Cronq.



C. canadensis. Detalle del capítulo maduro con aquenios



C. canadensis. Detalle del capítulo maduro con aquenios