

064 *Conyza sumatrensis* (Retz.) E. Walker

Contienda, Pina de Ebro (15/08/2016)

***Conyza sumatrensis* (Retz.) E. Walker**

NOMBRE VULGAR

Zamarraga

DESCRIPCIÓN

20-200 cm. Hierba anual, pelosa; tallos erectos, simples excepto en la inflorescencia; hojas alternas, oblongo-lanceoladas, dentadas o enteras, con nervios laterales visibles, densamente pubescentes; capítulos pedunculados; involucre con 4-5 filas de brácteas pelosas; flores blancuecinas, las externas filiformes; vilano de pelos denticulados

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Compositae

Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas, sin estípulas.

Hojas con espinas o inermes.

Flores sentadas, en capítulos rodeados por brácteas (involucro).

Pétalos soldados en su base y a veces en sus partes superiores.

Gineceo ínfero.

Estambres inapreciables o soldados por las anteras.

Cáliz transformado en un vilano generalmente formado por pelos, escamas o setas o ausente.

Fruto seco monospermo.

Género *Conyza*

Plantas anuales.

Hojas alternas, repartidas a lo largo del tallo.

Capítulos muy numerosos agrupados en panícula densa y alargada.

Lígulas muy pequeñas, apenas aparentes.

Brácteas imbricadas en varias filas.

Frutos con vilano de pelos.


Conyza sumatrensis

Hojas medias de 5 a 20 mm de anchura, oblongo-lanceoladas, pelosas, con nervios laterales visibles.

Inflorescencia en panícula (con forma piramidal).

Flores externas con lígulas filiformes.

Brácteas involucrales pelosas.



C. sumatrensis. Detalle de las flores y hoja dentada y con nervios laterales bien visibles.

064 *Conyza sumatrensis* (Retz.) E. Walker**ESPECIES SIMILARES**

Muy parecida a *Conyza canadensis*, sin vellosoidad y con capítulos con flores externas con lígulas blancas. *Conyza bonariensis* tiene los capítulos muy parecidos, pero es más vellosa, con hojas más estrechas (de 1 a 5 mm), menos dentadas y con nervios laterales poco visibles.



C. canadensis. Capítulo con flores externas liguladas.



C. bonariensis. Capítulo con flores externas con lígula filiforme y hoja uninervada y vellosa.

DISTRIBUCIÓN

Con origen en América del Sur, ha invadido Europa en época reciente encontrándose en expansión en Aragón. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de ambientes alterados, está presente en solares, orillas de caminos y campos de cultivo principalmente en ambientes de regadío. Florece desde julio hasta noviembre.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

C. sumatrensis. Detalle del tallo



C. sumatrensis. Detalle del tallo y hojas

064 *Conyza sumatrensis* (Retz.) E. Walker



C. sumatrensis. Detalle de la hoja: haz



C. sumatrensis. Detalle de la hoja: envés


064 *Conyza sumatrensis* (Retz.) E. Walker



C. sumatrensis. Detalle de la inflorescencia



C. sumatrensis. Detalle de las flores



C. sumatrensis. Detalle de las brácteas



C. sumatrensis. Detalle del capítulo floral



C. sumatrensis. Detalle del capítulo maduro con aquenios