

**064 *Crepis vesicaria* L.**



Trancar, Pina de Ebro (25/04/2015)

***Crepis vesicaria* L.**

**NOMBRE VULGAR**

-

**DESCRIPCIÓN**

10-60 cm. Hierba con tallos erectos, ramificados. Hojas inferiores pecioladas; las intermedias sésiles. Capítulos en corimbos laxos, raras veces solitarios; involucreo campanulado, a veces con pelos glandulíferos, con 2 filas de brácteas. Flores amarillas, de dorso algo purpúreo. Vilano de pelos muy finos, algo caedizo.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN**

**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN**

**Familia Compositae**

Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas, sin estípulas.

Hojas con espinas o inermes.

Flores sentadas, en capítulos rodeados por brácteas (involucreo).

Pétalos soldados en su base y a veces en sus partes superiores.

Gineceo ínfero.

Estambres inapreciables o soldados por las anteras.

Cáliz transformado en un vilano generalmente formado por pelos, escamas o setas o ausente.

Fruto seco monospermo.

**Género *Crepis***

Plantas con tomento, pero sin pelos estrellados.

Todas las flores liguladas.

Flores amarillas, a veces con tonos rojizos.

Aquenios atenuados en el ápice, sin pico.

Pelos del vilano generalmente de un blanco níveo, con más de 6 pelos no plumosos sobrepasando netamente el involucreo en la madurez.

***Crepis vesicaria***

Hojas medias divididas.

Capítulos numerosos.

Involucreo menor de 2 cm.

Frutos con vilano pedunculado, lod interiores cortos.

Aquenios externos e internos similares en longitud, los externos no adheridos a las brácteas involucrales.



***C. vesicaria.***

Hojas medias divididas;

frutos con vilano pedunculado,

los internos más cortos.



**064 *Crepis vesicaria* L.**



**ESPECIES SIMILARES**

Se han citado 4 especies más del género *Crepis*: *C. albida* tiene involucre de más de 2 cm de diámetro con brácteas ovadas; *C. capillaris* es una tenue hierba anual no glandulosa, con frutos con vilano sentado; *C. foetida* es muy similar a *C. vesicaria*, pero los frutos interiores son alargados y *C. pulchra* es planta glandulosa, tiene capítulos cilíndricos y frutos con vilano sentado.



*C. albida*. Involucro grande con brácteas ovadas.



*C. pulchra*. Planta glandulosa; frutos con vilano sentado y capítulos cilíndricos.



*C. capillaris*. Planta no glandulosa; frutos con vilano sentado.



*C. foetida*. Frutos interiores alargados.

**DISTRIBUCIÓN**

Elemento eurocircunmediterráneo. Presente en toda la Comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de orillas de caminos, campos abandonados o terrenos baldíos ligeramente degradados. Florece desde abril hasta julio.

**RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS**

- Agropyro cristati-Lygeetum sparti*
- Lygeo sparti-Stipetum lagascae*
- Ononidetum tridentatae*
- Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae*
- Salsolo vermiculatae-Pegonetum harmalae*
- Suaedetum verae*

**FAUNA ASOCIADA**

- Tephritis matricariae* (Diptera). Planta nutricia
- Lasioglossum prasinum* (Hymenoptera). En flores
- Aeolothrips intermedius* (Thysanoptera). Barrido
- Clanoptilus spinosus* (Coleoptera). Barrido
- Cryptocephalus rugicollis* (Coleoptera). Barrido
- Euchalcis vexans* (Hymenoptera). Barrido
- Exorista segregata* (Diptera). Barrido
- Forcipomyia armendarizi* (Diptera). Barrido
- Hardya tenuis* (Membracoidea). Barrido
- Nabis provencalis* (Prosorrhyncha). Barrido
- Nysius cymoides* (Prosorrhyncha). Barrido
- Orthotylus nassatus* (Prosorrhyncha). Barrido
- Polistes dominulus* (Hymenoptera). Barrido
- Polymerus cognatus* (Prosorrhyncha). Barrido
- Psilothrix viridicaerulea* (Coleoptera). Barrido
- Tenothrips frici* (Thysanoptera). Barrido
- Thaumatomyia notata* (Diptera). Barrido
- Thaumatomyia sulcifrons* (Diptera). Barrido
- Thrips angusticeps* (Thysanoptera). Barrido
- Thrips meridionalis* (Thysanoptera). Barrido

**064 *Crepis vesicaria* L.**



**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**



*C. vesicaria*. Detalle del tallo



*C. vesicaria*. Detalle de hoja inferior: envés



*C. vesicaria*. Detalle de hoja inferior: haz



*C. vesicaria*. Detalle de hoja superior



*C. vesicaria*. Detalle de capítulo floral inmaduro

**064 *Crepis vesicaria* L.**



*C. vesicaria*. Detalle del capítulo floral



*C. vesicaria*. Capítulo floral maduro



*C. vesicaria*. Detalle del capítulo floral



*C. vesicaria*. Capítulo floral maduro



*C. vesicaria*. Detalle del capítulo floral

**064 *Crepis vesicaria* L.**



*C. vesicaria*. Capítulo floral maduro



*C. vesicaria*. Capítulo floral maduro