

064 *Hedypnois cretica* (L.) Dum.-Cour.

Miralrío, Gelsa (13/04/2014)

***Hedypnois cretica* (L.) Dum.-Cours.**

NOMBRE VULGAR

No se ha encontrado

DESCRIPCIÓN

5-30 cm. Hierba anual, con pelos bífidos o trífididos; tallos ascendentes; hojas en su mayoría basales, oblongas, dentadas o raramente enteras; capítulos terminales, solitarios, con pedúnculos engrosados hacia el ápice; involucreo con 2 filas de brácteas; flores amarillas; aquenios con costillas aculeoladas.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Compositae

Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas, sin estípulas.

Hojas con espinas o inermes.

Flores sentadas, en capítulos rodeados por brácteas (involucreo).

Pétalos soldados en su base y a veces en sus partes superiores.

Gineceo ínfero.

Estambres inapreciables o soldados por las anteras.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Compositae**

Cáliz transformado en un vilano generalmente formado por pelos, escamas o setas o ausente.

Fruto seco monospermo.

Género *Hedypnois*. *Hedypnois cretica*

Plantas anuales.

Tallos con al menos una hoja bien desarrollada, hinchados en la parte superior.

Involucreo con dos filas de brácteas.

Flores amarillas.

Vilano sentado directamente sobre el aquenio.

Frutos de dos formas diferentes: los exteriores con vilano reducido a escamas inconspicuas, los interiores con escamas tan largas como el aquenio.



H. cretica. Tallos con una hoja bien desarrollada e hinchados en su parte superior,

ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra planta ya que es la única especie del género *Hedypnois* presente en la comarca.

DISTRIBUCIÓN

Región mediterránea. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de campos de cultivo abandonados, eriales y orillas de caminos, principalmente en ambientes de secano. Florece desde abril hasta junio.

064 *Hedypnois cretica* (L.) Dum.-Cour.



RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Agropyro cristati-Lygeetum sparti
Helianthemetum squamati
Lygeo sparti-Stipetum lagascae
Ononidetum tridentatae
Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae
Salsolo vermiculatae-Pegonetum harmalae
Suaedetum verae

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



H. cretica. Detalle de la hoja: envés



H. cretica. Detalle del tallo



H. cretica. Detalle de tallo con flor



H. cretica. Detalle de la hoja: haz



H. cretica. Detalle de capítulo floral

064 *Hedypnois cretica* (L.) Dum.-Cour.



H. cretica. Detalle de la flores



H. cretica. Detalle de las brácteas



H. cretica. Detalle de capítulo maduro con-
teniendo los aquenios