

064 *Lactuca saligna* L.

Talavera, Pina de Ebro (13/08/2013)

Lactuca saligna* L.*NOMBRE VULGAR**

-

DESCRIPCIÓN

40-100 cm. Planta de tallos erectos, pajizos. Hojas alternas, las inferiores con segmentos de ápice espinuloso, a veces de envés espinuloso en el nervio medio; las superiores lineares, sagitadas, con aurículas agudas. Capítulos solitarios o en glomérulos, en inflorescencia espiciforme; involucre cilíndrico, con varias filas de brácteas. Flores amarillas. Aquenios con el cuerpo marcadamente comprimido, verdoso, con reborde muy marcado. Vilano con 2 filas de pelos escábridos, caedizos, blanco.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Compositae

Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas, sin estípulas.

Hojas con espinas o inermes.

Flores sentadas, en capítulos rodeados por brácteas (involucro).

Pétalos soldados en su base y a veces en sus partes superiores.

Gineceo ínfero.

Estambres inapreciables o soldados por las anteras.

Familia Compositae

Cáliz transformado en un vilano generalmente formado por pelos, escamas o setas o ausente.

Fruto seco monospermo.

Género *Lactuca*

Hojas a lo largo del tallo.

Flores amarillas o azuladas.

Inflorescencia ramosa, provista de numerosos capítulos.

Aquenios lisos.

Vilano compuesto por pelos simples, separado del aquenio por un pedúnculo alargado.

Lactuca saligna

Tallos y hojas rígidos.

Hojas del tallo estrechamente lineares, agudas y sagitadas en la base.

Flores amarillas.

Capítulos sentados.

Frutos con aquenio, pedúnculo y vilano de igual longitud.

Frutos con el pico más largo que el cuerpo.

Aquenios con el cuerpo más oscuro que el pico.

064 *Lactuca saligna* L.

L. saligna. Hojas lineares de base sagitada; flor sentada; aquenios más oscuros que el pico.

ESPECIES SIMILARES

Las otras especies del género *Lactuca* citadas en la Comarca, *L. serriola* tiene las hojas con el nervio medio espinuloso-dentado y capítulos pedunculados. *L. viminea* tiene las hojas del tallo enteras y lineares con la base decurrente y aquenios negros con el cuerpo y el pico del mismo color.



L. serriola. Hojas con el nervio medio espinuloso-dentado y capítulos pedunculados.



L. viminea. hojas del tallo enteras y lineares con la base decurrente y aquenios negros con el cuerpo y el pico del mismo color.

DISTRIBUCIÓN

Elemento euromediterráneo iranoturaniano. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propio de suelos algo degradados con riqueza de sales. Florece entre junio y agosto.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

L. saligna. Detalle del tallo


064 *Lactuca saligna* L.




L. saligna. Detalle de hoja inferior




L. saligna. Detalle del capítulo floral



L. saligna. Detalle del capítulo floral



L. saligna. Detalle de hoja superior



L. saligna. Detalle del capítulo floral

064 *Lactuca saligna* L.



L. saligna. Capítulo floral maduro



L. saligna. Capítulo floral maduro