

064 *Launaea pumila* (Cav.) O. Kuntze

San Gregorio, Pina de Ebro (15/06/2013)

***Launaea pumila* (Cav.) O. Kuntze**

NOMBRE VULGAR

Escorzonera falsa

DESCRIPCIÓN

10-30 cm. Hierba ligeramente leñosa en la base, con tallos ascendentes sin vello; hojas inferiores muy divididas en segmentos no denticulados; involucreo cilíndrico con las brácteas terminadas en una callosidad blanca muy estrecha; flores amarillas.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Compositae

Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas, sin estípulas.

Hojas con espinas o inermes.

Flores sentadas, en capítulos rodeados por brácteas (involucreo).

Pétalos soldados en su base y a veces en sus partes superiores.

Gineceo ínfero.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Compositae**

Estambres inapreciables o soldados por las anteras.

Cáliz transformado en un vilano generalmente formado por pelos, escamas o setas o ausente.

Fruto seco monospermo.

Género *Launaea*

Capítulos solitarios en el ápice de los tallos.

Lóbulos de las hojas rematados por denticulos blancos.

Brácteas del involucro con margen membranoso.

Receptáculo liso o con pelos muy cortos.

Flores amarillas.

Vilano del fruto formado por pelos suaves y simples, sin pico al unirse al fruto.

Frutos aplanados, estrechados hacia el ápice.

Launaea pumila

Involucreo de 1-2 cm de anchura.

Brácteas del involucro con margen membranoso estrecho.



L. pumila. Detalle del margen de las brácteas del involucro.

ESPECIES SIMILARES

Especie muy parecida a *Launaea fragilis* que tiene las brácteas del involucro con margen escarioso ancho.



Launaea fragilis. Detalle del margen de las brácteas del involucro.



064 *Launaea pumila* (Cav.) O. Kuntze**DISTRIBUCIÓN**

Propia del mediterráneo occidental. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de matorrales pastoreados y suelos degradados en ambientes secos y soleados. Florece desde mayo hasta julio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Helianthemetum squamati

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

L. pumila. Detalle de hoja inferior: haz



L. pumila. Detalle del tallo



L. pumila. Detalle de hoja inferior: envés



L. pumila. Detalle de hoja superior

064 *Launaea pumila* (Cav.) O. Kuntze



L. pumila. Detalle de capítulo floral juvenil



L. pumila. Detalle de las brácteas del involucro



L. pumila. Detalle de capítulo floral



L. pumila. Detalle del capítulo con aque-



L. pumila. Detalle de las flores