

064 *Leontodon taraxacoides* (Vil.) Mér.

Deslinde, Pina de Ebro (29/06/2013)

***Leontodon taraxacoides* (Vill.) Mérat**

NOMBRE VULGAR

Lechugilla

DESCRIPCIÓN

5-25 cm. Hierba anual, con pelos compuestos; hojas sinuado-dentadas; capítulos solitarios, terminales; involucre con 2 filas de brácteas; flores liguladas, amarillas, las externas de dorso verdoso: aquenios externos con pico corto y vilano en forma de corona; los internos con vilano formado por una fila de pelos plumosos, ensanchados en la base.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Compositae

Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas, sin estípulas.

Hojas con espinas o inermes.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Compositae**

Flores sentadas, en capítulos rodeados por brácteas (involucre).

Pétalos soldados en su base y a veces en sus partes superiores.

Gineceo ínfero.

Estambres inapreciables o soldados por las anteras.

Cáliz transformado en un vilano generalmente formado por pelos, escamas o setas o ausente.

Fruto seco monospermo.

Género *Leontodon*

Tallos simples, sin hojas, terminados en un capítulo.

Hojas dispuestas en roseta basal.

Brácteas del involucre en varias filas.

Todas las flores liguladas.

Receptáculo liso entre las flores.

Algunos vilanos formados por pelos plumosos.

Leontodon taraxacoides

Raíces no engrosadas.

Hojas con pelos ramificados.

Involucre de aproximadamente 1 cm de altura.

Brácteas del involucre generalmente con pelos.

Aquenios externos con vilanos cortos o escamosos, los internos con vilano plumoso.



L. taraxacoides. Detalle de aquenios externos con vilano corto e internos con vilano plumoso

064 *Leontodon taraxacoides* (Vil.) Mér.**ESPECIES SIMILARES**

Las hojas con pelos ramificados y los aquenios externos con pelos del vilano muy cortos, diferencian a esta especie de las demás del género *Leontodon*.

DISTRIBUCIÓN

Especie europea. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de ambientes herbosos, en orillas de caminos y claros boscosos. Florece desde junio hasta septiembre.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Agropyro cristati-Lygeetum sparti

Lygeo sparti-Stipetum lagascae

Ononidetum tridentatae

Rosmarino officinali-Linetum suffruticosi

Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae

Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae

Suaedetum verae

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

L. taraxacoides. Detalle del tallo



L. taraxacoides. Detalle de la hoja: haz



L. taraxacoides. Detalle de la hoja: envés



L. taraxacoides. Detalle del capítulo floral



L. taraxacoides. Detalle de las flores

064 *Leontodon taraxacoides* (Vil.) Mér.



L. taraxacoides. Detalle de las brácteas



L. taraxacoides. Detalle de capítulo maduro con aquenios



L. taraxacoides. Detalle de capítulo maduro con aquenios



L. taraxacoides. Detalle de los aquenios



L. taraxacoides. Detalle de capítulo maduro con aquenios