

064 *Picris echioides* L.

Greque, Pina de Ebro (04/07/2013)

***Picris echioides* L.**

NOMBRE VULGAR

Raspasayo

DESCRIPCIÓN

40-120 cm. Planta algo espinosa y pelos rígidos y ásperos. Tallos ramificados, foliosos. Hojas alternas, las inferiores pecioladas. Capítulos pedunculados, en cimas terminales; involucreo con 3 filas de brácteas, las externas algo más cortas que las internas, de borde espinoso. Flores amarillas. Aquenios rugosos con pico delgado; vilano con numerosos pelos plumosos en 2 filas.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Compositae

Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas, sin estípulas.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Compositae

Hojas con espinas o inermes.

Flores sentadas, en capítulos rodeados por brácteas (involucro).

Pétalos soldados en su base y a veces en sus partes superiores.

Gineceo ínfero.

Estambres inapreciables o soldados por las anteras.

Cáliz transformado en un vilano generalmente formado por pelos, escamas o setas o ausente.

Fruto seco monospermo.

Género *Picris*

Tallos con pelos rígidos, simples, a menudo ganchudos en el extremo.

Tallos con frecuencia ramificados y generalmente provistos de varios capítulos.

Hojas en el tallos presentes, más o menos hispídas.

Todas las flores liguladas.

Brácteas involucrales a diferentes alturas.

Vilano con pelos soldados en la base.

Vilano con más de 6 pelos y. al menos los centrales, plumosos.

Receptáculo sin escamas.

Picris echioides

Brácteas involucrales externas anchamente ovado-cordiformes, mucho más anchas que las internas.

Aquenios con pico tan largo como el cuerpo.



P. echioides. Brácteas involucrales externas mucho más anchas que las internas

ESPECIES SIMILARES

Entre las especies del género *Picris*, *P. echioides* es la única que tiene y los aquenios con pico tan largo como el cuerpo.

064 *Picris echioides* L.**DISTRIBUCIÓN**

Elemento euromediterráneo. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos en llares húmedos y degradados como lindes entre campos u orillas de caminos en cultivos de regadío. Florece entre junio y septiembre.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Typheto-Schoenoplectetumtabernaemontani

Urticeto-Sambucetum ebuli

Atripliceto-Silenetum rubellae

Hordeetumleporini malvetosum

Holoschoenetum

COMENTARIOS Y USOS

Parece ser que las hojas se empleaban en cocimiento como antidiarreicas.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

P. echioides. Detalle de hoja inferior: haz



P. echioides. Detalle del tallo



P. echioides. Detalle de hoja inferior: envés

064 *Picris echioides* L.



P. echioides. Detalle de hoja superior: haz



P. echioides. Detalle del capítulo floral



P. echioides. Detalle de hoja superior: envés



P. echioides. Detalle del capítulo floral



P. echioides. Detalle del capítulo floral



P. echioides. Capítulo floral maduro

064 *Picris echioides* L.



P. echioides. Capítulo floral maduro



P. echioides. Capítulo floral maduro