

064 *Scorzonera laciniata* L.

Val de Abellera, Pina de Ebro 10/04//2014)

Scorzonera laciniata* L.*NOMBRE VULGAR**

Zaragayos

DESCRIPCIÓN

10-40 cm. Planta de tallos ramificados. Hojas generalmente partidas, con segmentos lineares, rara vez enteras. Capítulos terminales, solitarios; pedúnculos no engrosados; involucreo en flor con 3-4 filas de brácteas. Lígulas sobrepasando en 3-7 mm al involucreo, amarillas. Aquenios estriados, grisáceos, con base tubulosa hueca y blanquecina. Vilano plumoso.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Compositae**

Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas, sin estípulas.

Hojas con espinas o inermes.

Flores sentadas, en capítulos rodeados por brácteas (involucro).

Pétalos soldados en su base y a veces en sus partes superiores.

Gineceo ínfero.

Estambres inapreciables o soldados por las anteras.

Cáliz transformado en un vilano generalmente formado por pelos, escamas o setas o ausente.

Fruto seco monospermo.

Género *Scorzonera*

hojas simples, de oval-lanceoladas a lineares, o pinnadas, glabrescentes y repartidas a lo largo del tallo.

Todas las flores liguladas.

Capítulos grandes. de más de 2,5 cm de longitud.

Brácteas del involucreo dispuestas en varias filas.

Aquenios sin pico, de ordinario atenuados en la parte superior.

Vilano con más de 6 pelos y, al menos los centrales, plumosos.

Scorzonera laciniata

Con hojas divididas (a veces algunas enteras).

Aquenios con la parte inferior hinchada y hueca.



S. laciniata. Hojas divididas y aquenios con la parte inferior hinchada y hueca.

ESPECIES SIMILARES

Es la única especie del género *Scorzonera* que tiene hojas divididas.

064 *Scorzonera laciniata* L.**DISTRIBUCIÓN**

Elemento paleotemplado. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de campos abandonados, lindes, pastizales y entre cultivos tanto de regadío como de secano. Florece entre mayo y julio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Agropyro cristati-Lygeetum sparti
Carduo pycnocephali-Hordeetum leporini
Helianthemetum squamati
Lygeo sparti-Stipetum lagascae
Ononidetum tridentatae
Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi
Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae
Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae
Sideritetum cavanillesii
Suaedetum verae

FAUNA ASOCIADA

Tephritis pulchra (Diptera). Planta nutricia

COMENTARIOS Y USOS

Antiguamente se creía que la escorzonera curaba las mordeduras de víbora.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

S. laciniata. Detalle del tallo



S. laciniata. Detalle de hoja: haz



S. laciniata. Detalle de hoja: envés

064 *Scorzonera laciniata* L.



S. laciniata. Capítulo floral inmaduro



S. laciniata. Detalle del capítulo floral



S. laciniata. Detalle del capítulo floral



S. laciniata. Capítulo floral maduro



S. laciniata. Detalle del capítulo floral



S. laciniata. Capítulo floral maduro

064 *Scorzonera laciniata* L.



S. laciniata. Capítulo floral maduro