

064 *Staehelina dubia* L.

Vireta, Pina de Ebro (26/06/2016)

Staehelina dubia* L.*NOMBRE VULGAR**

Hierba pincel

DESCRIPCIÓN

20-40 cm. Mata grisácea; tallos erectos, generalmente ramificados; hojas alternas, lineares, entera y de margen revoluto, de haz grisáceo o verdoso y envés blanco-tomentoso; capítulos terminales; flores flosculosas, rosadas; aquenios con anillo apical; vilano de pelos ramificados en el tercio basal, que superan largamente al involucre.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Compositae**

Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas, sin estípulas.

Hojas con espinas o inermes.

Flores sentadas, en capítulos rodeados por brácteas (involucro).

Pétalos soldados en su base y a veces en sus partes superiores.

Gineceo ínfero.

Estambres inapreciables o soldados por las anteras.

Cáliz transformado en un vilano generalmente formado por pelos, escamas o setas o ausente.

Fruto seco monospermo.

Género *Staehelina*. *Staehelina dubia*

Plantas leñosas en la base.

Hojas enteras.

Capítulos estrechamente cilíndricos, de 4 a 5 veces más largos que anchos.

Involucro con brácteas rojizas, imbricadas en varios niveles.

Vilano caduco, que se separa en varios fascículos independientes de pelos.

*S. dubia*. Detalle del capítulo floral y vilano.**ESPECIES SIMILARES**Es la única especie del género *Staehelina* presente en la Comarca.

064 *Staehelina dubia* L.



DISTRIBUCIÓN

Elemento mediterráneo occidental. Presente en las zonas más altas de la Comarca, evitando el frío producido por la inversión térmica.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de matorrales bien conservados en claros de pinar-carrascal. Florece en junio y julio.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



S. dubia. Detalle de hoja superior: haz



S. dubia. Detalle de tallo joven



S. dubia. Detalle de hoja superior: envés



S. dubia. Detalle de tallo viejo

064 *Staehelina dubia* L.



S. dubia. Detalle de hoja inferior: haz



S. dubia. Detalle de capítulo floral



S. dubia. Detalle de hoja inferior: envés



S. dubia. Detalle de las flores

064 *Staehelina dubia* L.



S. dubia. Detalle del capítulo con achenios

S. dubia. Detalle de las brácteas del involucre



S. dubia. Detalle del capítulo con achenios