

064 *Taraxacum obovatum* (Willd.) DC

La Retuerta, Pina de Ebro (02/04/2015)

***Taraxacum obovatum* (Willd.) DC**

NOMBRE VULGAR

Diente de león

DESCRIPCIÓN

5-15 cm. Planta de hojas obovadas, generalmente enteras. Pedúnculos glabrescentes. Capítulos terminales, solitarios. Brácteas involucrales verdosas, al menos algunas de ápice corniculado. Flores amarillas. Aquenios amarillentos o verdosos, en la parte superior con protuberancias escamiformes, bruscamente adelgazado en un cono apical. Vilano de pelos blancos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Compositae

Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas, sin estípulas.

Hojas con espinas o inermes.

Flores sentadas, en capítulos rodeados por brácteas (involucro).

Pétalos soldados en su base y a veces en sus partes superiores.

Gineceo ínfero.

Estambres inapreciables o soldados por las anteras.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Compositae

Cáliz transformado en un vilano generalmente formado por pelos, escamas o setas o ausente.

Fruto seco monospermo.

Género *Taraxacum*

Hojas todas en roseta basal.

Todas las flores liguladas.

Involucro oval.

Aquenios con pico no inserto en una corona.

Aquenios no comprimidos, con escamas y/o aguijones en la mitad superior.

Vilano con más de 6 pelos no plumosos.

Taraxacum obovatum

Hojas anchamente obovadas, dentadas o muy poco divididas.

Escapos y envés de las hojas glabros o glabrescentes, a veces algo araneosos.

Involucro verde, a veces con linte purpúreo.

Brácteas erguidas, las internas con cuernos largos y muy notorios.

Brácteas externas ovadas o anchamente lanceoladas, más anchas que las internas.



T. obovatum. Hojas poco divididas; brácteas involucrales erguidas.

ESPECIES SIMILARES

De las dos especies más del género *Taraxacum* presentes en la Comarca, *T. officinale* tiene las hojas divididas y las brácteas involucrales externas colgantes, *T. pyrrhopappum* tiene las hojas divididas blanquecinas por el envés y el involucro rosado y no verde.

064 *Taraxacum obovatum* (Willd.) DC

T. officinale. Hojas divididas; brácteas involucrales externas colgantes



T. pyrrhopappum. Hojas divididas blanquecinas por el envés; involucre rosado.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

T. obovatum. Detalle del tallo



T. obovatum. Detalle de la hoja: haz

DISTRIBUCIÓN

Elemento mediterráneo centro-occidental. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de lugares abiertos en pastizales en ambiente de secano. Florece desde abril hasta junio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Agropyro cristati-Lygeetum sparti
Lygeo sparti-Stipetum lagascae
Rosmarino officinali-Linetum suffruticosi
Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi
Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae
Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae
Sideritetum cavanillesii

FAUNA ASOCIADA

Idaea subsaturata (Lepidoptera). Planta nutricia

064 *Taraxacum obovatum* (Willd.) DC



T. obovatum. Detalle de la hoja: envés



T. obovatum. Detalle del capítulo floral



T. obovatum. Detalle del capítulo floral



T. obovatum. Detalle del capítulo floral



T. obovatum. Capítulo floral maduro

064 *Taraxacum obovatum* (Willd.) DC



T. obovatum. Capítulo floral maduro



T. obovatum. Capítulo floral maduro



T. obovatum. Detalle de los aquenios