

**064 *Taraxacum officinale* Weber**

Rebollar, Pina de Ebro (27/03/2015)

***Taraxacum officinale* Weber****NOMBRE VULGAR**

Diente de león

**DESCRIPCIÓN**

10-40 cm. Planta con hojas divididas. Capítulos terminales, solitarios. Brácteas involucrales verdosas, de ápice no corniculado, colgantes; las internas soldadas en la base. Flores amarillas. Aqueños pardo-verdosos con cuerpo costillado, adelgazado en un cono apical; Vilano blanco.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**Familia Compositae**

Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas, sin estípulas.

Hojas con espinas o inermes.

Flores sentadas, en capítulos rodeados por brácteas (involucro).

Pétalos soldados en su base y a veces en sus partes superiores.

Gineceo ínfero.

Estambres inapreciables o soldados por las anteras.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Familia Compositae**

Cáliz transformado en un vilano generalmente formado por pelos, escamas o setas o ausente.

Fruto seco monospermo.

**Género *Taraxacum***

Hojas todas en roseta basal.

Todas las flores liguladas.

Involucro oval.

Aqueños con pico no inserto en una corona.

Aqueños no comprimidos, con escamas y/o aguijones en la mitad superior.

Vilano con más de 6 pelos no plumosos.

***Taraxacum officinale***

Hojas profundamente divididas.

Brácteas externas ovadas o anchamente lanceoladas, más anchas que las internas.

Brácteas sin cuernos ni gibosidades.

Involucro verde, a veces con tinte purpúreo.

Involucro con las brácteas externas revolutas o muy patentes.

Escapos de ordinario con laxa pelosidad arañosa en la parte apical, bajo los capítulos.

Aqueños grisáceos o amarillentos, con prolongación basal del pico cónica.



*T. officinale*. Hojas divididas; brácteas involucrales externas colgantes

**ESPECIES SIMILARES**

De las dos especies más del género *Taraxacum* presentes en la Comarca, *T. obovatum* tiene las hojas poco divididas y las brácteas involucrales externas erguidas, *T. pyrrhopappum* tiene las hojas divididas blanquecinas por el envés y el involucro rosado y no verde.

**064 *Taraxacum officinale* Weber**

*T. obovatum*. Hojas poco divididas; brácteas involucrales erguidas.



*T. pyrrhopappum*. Hojas divididas blanquecinas por el envés; involucre rosado.

**DISTRIBUCIÓN**

Elemento holártico. Presente en toda la Comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de herbazales nitrófilos y en campos principalmente de regadío.. Florece desde febrero hasta noviembre.

**FAUNA ASOCIADA**

*Idaea subsaturata* (Lepidoptera). Planta nutricia

**COMENTARIOS Y USOS**

Tomada en ensalada es planta aperitiva y purificadora de la sangre; recibe también el nombre de *herba urinaria* debido a sus propiedades diuréticas. La raíz desecada y tostada se empleaba en tiempos de necesidad como sustituto del café. El átex, igualmente, ha sido usado para tratar verrugas y erupciones de la piel.

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**

*T. officinale*. Detalle del tallo



*T. officinale*. Detalle de la hoja: haz



## 064 *Taraxacum officinale* Weber



*T. officinale*. Detalle de la hoja: envés



*T. officinale*. Detalle del capítulo floral



*T. officinale*. Detalle del capítulo floral



*T. officinale*. Detalle del capítulo floral



*T. officinale*. Capítulo floral maduro

## 064 *Taraxacum officinale* Weber



*T. officinale*. Capítulo floral maduro



*T. officinale*. Detalle de los aquenios



*T. officinale*. Capítulo floral maduro



*T. officinale*. Capítulo floral maduro