

064 *Tragopogon porrifolius* L.

Val de Abellera, Pina de Ebro (14/05/2016)

Tragopogon porrifolius* L.*NOMBRE VULGAR**

Salsifí, barba cabruna

DESCRIPCIÓN

20-60 cm. Planta con tallos simples o ramificados desde la mitad superior, sin vellosidad. Hojas basales numerosas, lineares, de margen liso o undulado. Capítulos terminales, solitarios; pedúnculos marcadamente engrosados en la antesis; involucreo con una fila de brácteas lanceoladas. Lígulas violáceas, amarillentas en la base y en los dientes. Aquenios rectos, atenuados en un pico. Vilano plumoso.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Compositae

Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas, sin estípulas.

Hojas con espinas o inermes.

Flores sentadas, en capítulos rodeados por brácteas (involucro).

Pétalos soldados en su base y a veces en sus partes superiores.

Gineceo ínfero.

Estambres inapreciables o soldados por las anteras.

Cáliz transformado en un vilano generalmente formado por pelos, escamas o setas o ausente.

Fruto seco monospermo.

Género *Tragopogon*

Hojas simples, de lanceoladas a lineares, o pinnadas, glabrescentes y repartidas a lo largo del tallo.

Capítulos grandes. de más de 2,5 cm de longitud.

Brácteas del involucreo dispuestas en 1 fila.

Todas las flores liguladas

Aquenios prolongados en pico.

Vilano con más de 6 pelos y. al menos los centrales plumosos.

Tragopogon porrifolius

Hojas lanceoladas o lanceolado-lineares, de más de 1 cm de anchura en su base.

Flores rojizo-vinosas o violáceas.

Pedúnculos netamente hinchados en la parte superior, bajo el capítulo.



T. porrifolius.


Hojas ensanchadas en la base; flores rojizas.

064 *Tragopogon porrifolius* L.



ESPECIES SIMILARES

De las dos especies más del género *Tragopogon* citadas en la Comarca, *T. crocifolius* tiene las flores también rojizas pero las hojas no están ensanchadas en la base, *T. dubius* tiene las flores amarillas.



T. crocifolius.
Hojas no ensanchadas en la base; flores rojizas.



AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



T. porrifolius. Detalle del tallo



T. porrifolius. Detalle de la hoja: envés

T. dubius. Flores amarillas.

DISTRIBUCIÓN

Elemento eurocircunmediterráneo. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de matorrales y espartales en seco, principalmente sobre yesos.. Florece entre mayo y julio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Lygeetum-Stipetum lagascae

COMENTARIOS Y USOS

Las raíces pueden comerse en ensalada, fritas o guisadas y se dice que tienen en sabor de la carne siendo diurética y aperitiva.

064 *Tragopogon porrifolius* L.



T. porrifolius. Detalle de la hoja: haz



T. porrifolius. Detalle del capítulo floral



T. porrifolius. Detalle del capítulo floral



T. porrifolius. Detalle del capítulo floral




T. porrifolius. Capítulo floral maduro

064 *Tragopogon porrifolius* L.



T. porrifolius. Capítulo floral maduro



T. porrifolius. Detalle de los aquenios



T. porrifolius. Capítulo floral maduro



T. porrifolius. Detalle de los aquenios