

**069 *Rapistrum rugosum* (L.) All.**

La Vega, Pina de Ebro (13/04/2013)

***Rapistrum rugosum* (L.) All.**

**NOMBRE VULGAR**

Jaramago, rabaniza amarilla, libiana

**DESCRIPCIÓN**

20-90 cm. Hierba con hojas basales que van de enteras a muy divididas, las hojas superiores por lo general más enteras que las basales; flores de color amarillo, en racimos terminales; frutos pegados al tallo, globosos y con un apéndice terminal.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Familia Cruciferae**

Hojas sin estípulas.

Flores con cáliz y corola diferenciados.

Flores con 4 pétalos y 4 sépalos

Flores con 6 estambres, rara vez con 2 ó 4.

Flores con gineceo súpero.

Fruto que se abre por valvas, siendo más largo que ancho (silicua) o tan ancho como largo (silícula).

**Género *Rapistrum*. *Rapistrum rugosum***

Planta con vellosidad.

Hojas más o menos divididas y con peciolo.

Flores amarillas.

Frutos formados por dos partes, la superior en pico y la inferior, con las semillas, abultada.

Frutos verrugosos, no mucho más largos que anchos, que crecen pegados al tallo.

Frutos que al madurar caen enteros al suelo.

**ESPECIES SIMILARES**

Es la única especie del género *Rapistrum* presente en la zona, que se caracteriza por sus hojas divididas, flores amarillas y forma característica del fruto.

**DISTRIBUCIÓN**

Norte de Europa hasta el oeste de Asia y parte occidental del norte de África. Presente en toda la Comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de campos de cultivo y orillas de caminos, principalmente en ambientes de regadío, pero también en secano. Florece desde abril hasta junio.

**RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS**

*Carduo pycnocephali*-*Hordeetum leporini*

*Chenopodietum muralis*

*Roemerio violaceae*-*Hypecoetum penduli*

*Salsolo vermiculatae*-*Artemisietum herba-albae*

*Salsolo vermiculatae*-*Peganetum harmalae*

*Suaedetum verae*

**069 *Rapistrum rugosum* (L.) All.****COMENTARIOS Y USOS**

Las hojas son comestibles en ensalada o como verdura cuando son tiernas. Es planta de interés melífero.

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**

*R. rugosum* en la orilla de un camino.



*R. rugosum*. Detalle de la hoja: envés



*R. rugosum*. Detalle de la hoja: haz



*R. rugosum*. Detalle de tallo con flores y frutos

**069 *Rapistrum rugosum* (L.) All.**



*R. rugosum*. Detalle de la flor



*R. rugosum*. Detalle del fruto



*R. rugosum*. Detalle de la corola



*R. rugosum*. Detalle del cáliz