


079 *Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small



Talavera, Pina de Ebro (05/08/2013)

Chamaesyce prostrata (Aiton) Small

NOMBRE VULGAR

Nogueruela postrada

DESCRIPCIÓN

5-35 cm. Hierba pelosa, con tallos ramificados desde la base; hojas oblongas, con margen serrulado, vellosas sólo por en envés; ciatios con 4-5 flores masculinas; frutos ovoideos, pelosos; semillas grisáceas.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Euphorbiaceae

Plantas herbáceas o leñosas.

Plantas habitualmente con látex, pero no siempre.

Hojas nunca palmeadas. Pueden ser enteras, serradas o lobuladas, generalmente con estípulas.

Flores sepaloideas, formadas por piezas verdes o poco coloreadas.

Si el gineceo es tricarpelar, entonces con fruto en caja con tres cavidades albergando una semilla cada una.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Euphorbiaceae

Si la flor es unisexual, entonces con un periantio de 3 sépalos: las masculinas con estambres numerosos y las femeninas con dos carpelos.

Algunas especies con inflorescencia formada por varias flores masculinas, reducidas a un estambre, y una flor femenina con ovario pediculado.

Algunas especies con flores con 3 segmentos en el periantio y 2 estilos.

Cáliz con 3-5 sépalos más o menos soldados, a veces ausentes.

Frutos con más de una semilla, algunas especies con frutos colgantes y pedunculados.

Género *Chamaesyce*

Plantas con látex.

Flores reunidas en ciatios.

Hojas opuestas, de base asimétrica y con estípulas.

Semillas sin carúncula.

Chamaesyce prostrata

Plantas prostradas.

Estípulas pelosas y desiguales.

Frutos pelosos sólo en las quillas y en el ápice.

Semillas con pliegues transversales.

ESPECIES SIMILARES

Las estípulas pelosas y desiguales y los frutos pelosos sólo en las quillas y en el ápice diferencian a esta especie de las demás del género *Chamaesyce*.

DISTRIBUCIÓN

Originaria del Caribe, en la actualidad se encuentra naturalizada en muchas partes del planeta. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos pisoteados y huertos de regadío; coloniza también huecos en calles y aceras de núcleos urbanos. Florece desde abril hasta octubre.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

079 *Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small



GALERÍA FOTOGRÁFICA



CH. prostrata. Detalle del tallo



CH. prostrata. Detalle de rama con hojas: vista posterior.



CH. prostrata. Detalle de rama con hojas: vista anterior.



CH. prostrata. Detalle de las hojas: haz



CH. prostrata. Detalle de las hojas: envés


079 *Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small



CH. prostrata. Detalle de rama con flores



CH. prostrata. Detalle de rama con frutos



CH. prostrata. Detalle de una cápsula