

079 *Centaurium pulchellum* (Swartz) Druce

Deslinde, Pina de Ebro (27/06/2013)

***Centaurium pulchellum* (Swartz) Druce**

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

3-20 cm. Planta con ramificaciones basales erectas, sin roseta de hojas en la base. Hojas generalmente igualando o más largas que los entrenudos, opuestas, lanceoladas, trinervadas. Inflorescencia en panícula; brácteas lanceoladas o elípticas. Flores pentámeras; corola de color rosa. Cápsula oblongoidea, polisperma.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Gentianaceae**

Hojas opuestas, a veces verticiladas.

Flores con carpelos soldados.

Corola vistosa, generalmente de colores vivos.

Pétalos soldados por su base y frecuentemente también por sus partes superiores.

Gineceo súpero.

Estambres alternos a los pétalos, en número igual o menor que ellos.

Frutos capsulares con semillas sin pelos.

Género *Centaurium*

Hojas sésiles o cortamente pecioladas.

Cáliz profundamente dividido en 4-5 segmentos sublineares.

Corolas rosas o rojo-púrpuras.

Gineceo terminado en estilo.

Estambres arrollados en espiral en su madurez.

Centaurium pulchellum

Planta anual.

Tallo ramificado desde cerca de la base, con solo 2 a 4 entrenudos antes de las flores.

Hojas del tallo ovaladas o lanceoladas, trinervias.

Inflorescencia más o menos corimbiforme.

Cáliz tan largo como el tubo de la corola.



C. pulchellum. Hojas trinervias.

C. pulchellum. Tallo ramificado desde cerca de la base.



079 *Centaurium pulchellum* (Swartz) Druce



ESPECIES SIMILARES

Las otras dos especies del género *Centaurium* citadas en la Comarca son *C. quadrifolium* con hojas lineares de un solo nervio y *C. tenuiflorum* con tallo ramificado solo en su mitad superior.




C. quadrifolium.
Hojas lineares de un solo nervio

GALERÍA FOTOGRÁFICA



C. pulchellum. Detalle del tallo con hojas



C. tenuiflorum. Hojas trinervias y tallo ramificado solo en su mitad superior.



C. pulchellum. Detalle de la hoja: haz

DISTRIBUCIÓN

Elemento paleotemplado. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de pastizales temporalmente húmedos, como graveras, cunetas de caminos o campos de regadío. Florece desde mayo hasta septiembre.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

079 *Centaurium pulchellum* (Swartz) Druce



C. pulchellum. Detalle de la hoja: envés



C. pulchellum. Detalle de la flor



L. pulchellum. Detalle de la corola



C. pulchellum. Detalle de la inflorescencia



L. pulchellum. Detalle del cáliz

079 *Centaurium pulchellum* (Swartz) Druce



C. pulchellum. Detalle del fruto