

079 *Centaurium tenuiflorum* (Hoff. & Link) Fritsch

Deslinde, Pina de Ebro (29/06/2013)

***Centaurium tenuiflorum* (Hoffmanns. & Link) Fritsch**

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

5-30 cm. Planta sin ramificaciones basales ni roseta de hojas desarrollada en la base. Hojas generalmente más cortas o casi igualando a los entrenudos, opuestas, trinervadas. Flores pentámeras; corola con lóbulos rosados, rosado-púrpúreos o blanquecinos. Cápsula oblongoidea, polisperma.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Gentianaceae

Hojas opuestas, a veces verticiladas.

Flores con carpelos soldados.

Corola vistosa, generalmente de colores vivos.

Pétalos soldados por su base y frecuentemente también por sus partes superiores.

Gineceo súpero.

Estambres alternos a los pétalos, en número igual o menor que ellos.

Frutos capsulares con semillas sin pelos.

Género *Centaurium*

Hojas sésiles o cortamente pecioladas.

Cáliz profundamente dividido en 4-5 segmentos sublineares.

Corolas rosas o rojo-púrpuras.

Gineceo terminado en estilo.

Estambres arrollados en espiral en su madurez.

Centaurium tenuiflorum

Planta anual.

Tallo ramificado solamente en su mitad superior, con 5 a 10 entrenudos antes de las flores.

Hojas del tallo ovaladas o lanceoladas, trinervias.

Inflorescencia más o menos corimbiforme.

Pedúnculos florales con menos de 2 mm.

Cáliz tan largo como el tubo de la corola.



C. tenuiflorum. Hojas trinervias y tallo ramificado solo en su mitad superior.


ESPECIES SIMILARES

Las otras dos especies del género *Centaurium* citadas en la Comarca son *C. quadrifolium* con hojas lineares de un solo nervio y *C. pulchellum* con tallo ramificado desde la base.

079 *Centaurium tenuiflorum* (Hoff. & Link) Fritsch 



C. quadrifolium.
Hojas lineares de un solo nervio



C. pulchellum. Hojas trinervias.

C. pulchellum. Tallo ramificado desde cerca de la base.



GALERÍA FOTOGRÁFICA



C. tenuiflorum. Detalle del tallo con hojas



C. tenuiflorum. Detalle de la hoja: haz

DISTRIBUCIÓN

Elemento paleotemplado. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de pastizales temporalmente húmedos, como graveras, cunetas de caminos o campos de regadío. Florece desde abril hasta julio.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.


079 *Centaurium tenuiflorum* (Hoff. & Link) Fritsch



C. tenuiflorum. Detalle de la hoja: envés




C. tenuiflorum. Detalle de la flor



C. tenuiflorum. Detalle de la corola




C. tenuiflorum. Detalle de la inflorescencia



C. tenuiflorum Detalle del cáliz

079 *Centaurium tenuiflorum* (Hoff. & Link) Fritsch



C. tenuiflorum. Detalle del fruto