

094 *Nepeta ucranica* L.

Vireta, Pina de Ebro (12/05/2017)

Nepeta ucranica L. subs. *braun-blanquetii*
O. Bolòs

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

25-70 cm. Planta de forma cónica, con ramas patentes; tallos con pelos cortos; hojas muy estrechas, sobre todo las superiores; inflorescencia muy ramificada, con cimas de 3 a 5 flores largamente pedunculadas; flores unisexuales; corola bilabiada, con labio superior recto, blanquecina o violeta pálido.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Labiatae**

Plantas generalmente aromáticas.

Hojas generalmente opuestas.

Flores con gineceo súpero y pétalos soldados al menos en la base.

Flores con 2 a 4 estambres, en número igual o menor que el de los pétalos.

Estilo surgiendo de la base del ovario.

Frutos que se separan en 2 a 4 núculas monospermas.

Género *Nepeta*

Plantas erectas.

Hojas más largas que anchas.

Inflorescencia terminal con verticilastros plurifloros.

Flores con corola formada por un tubo que se abre en dos mitades o labios desiguales.

Estambres externos más cortos que los internos.

Cáliz con 15 nervios y 5 dientes.

Frutos redondeados en el ápice.


Nepeta ucranica

Planta irregularmente cónica.

Tallos sin glándulas sentadas, con pelos que no superan los 0,3 mm de longitud.

Inflorescencia ramificada, con cimas de 3 a 5 flores largamente pedunculadas


Flores unisexuales, de blancas a violeta pálido.



N. ucranica. Detalle de la inflorescencia muy ramificada y flores de color blanco

094 *Nepeta ucranica* L.**ESPECIES SIMILARES**

La otra especie del género *Nepeta* presente en la comarca es *N. amethystina*, con inflorescencia poco ramificada y flores de color azulado.



N. amethystina.
Detalle de la inflorescencia poco ramificada y flores de color azulado

DISTRIBUCIÓN

Elemento endémico de la Península Ibérica. En Aragón ha sido citada únicamente en la Depresión del Ebro, en la Sierra de Alcubierre (de donde procede el ejemplar fotografiado) y Vedado de Fraga.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos profundos en matorrales y pastizales que aparecen en los claros de pinares o coscojares. Florece desde mayo hasta junio.

FAUNA Y FLORA ASOCIADAS

Se han encontrado agallas producidas por un díptero Cecidomyiidae probablemente no descrito todavía (Dr. Nieves Aldrey *com. pers.* (Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid)))



N. ucranica. Agalla de Cecidomyiidae (Diptera) prob. *sp. nov.*

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

N. ucranica. Detalle del tallo



N. ucranica. Detalle del tallo y hojas superiores



N. ucranica. Detalle del tallo y hojas inferiores

094 *Nepeta ucranica* L.



N. ucranica. Detalle de hoja superior: haz



N. ucranica. Detalle de hoja inferior: envés



N. ucranica. Detalle de hoja superior: envés



N. ucranica. Detalle de inflorescencia



N. ucranica. Detalle de hoja inferior: haz



N. ucranica. Detalle de la flor

094 *Nepeta ucranica* L.




N. ucranica. Detalle de la corola



N. ucranica. Detalle del cáliz con frutos



N. ucranica. Detalle del cáliz



N. ucranica. Detalle del cáliz con frutos



N. ucranica. Detalle del cáliz tras la floración