

094 *Sideritis ilicifolia* Willd.

Vireta, Pina de Ebro (19/06/2013)

***Sideritis ilicifolia* Pourret**

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

20-40 cm. Planta erecta, con indumento de pelos largos. Hojas lanceoladas de ápice espinoso y con espinas laterales dispuestas sobre cortos dientes triangulares. Inflorescencia verticilada, habitualmente con verticilastros separados. Brácteas ovadas, con dientes espinosos. Cáliz con tubo levemente nervado. Corola amarilla. Núculas lisas, sin vellosidad, de color castaño.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Labiatae**

Plantas generalmente aromáticas.

Hojas generalmente opuestas.

Flores con gineceo súpero y pétalos soldados al menos en la base.

Flores con 2 a 4 estambres, en número igual o menor que el de los pétalos.

Estilo surgiendo de la base del ovario.

Frutos que se separan en 2 a 4 núculas monospermas.

Género *Sideritis*

Hojas con limbo lanceolado o linear.

Brácteas más anchas que las hojas.

Flores dispuestas en verticilastros más o menos esféricos, distanciados entre sí.

Cáliz con 5 dientes de ordinario casi tan largos como el tubo.

Estambres incluidos en el interior del tubo de la corola, con dicho tubo más corto que el cáliz.

Sideritis ilicifolia

Planta leñosa en la base, con poca vellosidad.

Hojas dentadas, verdosas, con dientes espiniscentes.

Inflorescencia formada por verticilastros distanciados.

Corola más larga que el cáliz.

Brácteas poco divididas, las inferiores menores que los cálices.



S. ilicifolia. Detalle de la flor y la hoja.

094 *Sideritis ilicifolia* Willd.**ESPECIES SIMILARES**

El ser planta leñosa de tallos con poca vellosidad y tener hojas dentadas con dientes espiniscentes, inflorescencias con los verticilastros distantes, brácteas poco divididas, las inferiores más cortas que el cáliz y corola uniformemente amarilla más larga que el cáliz separan a esta especie de las demás del género *Sideritis* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Endemismo de la parte central y oriental del Valle del Ebro. Encontrado en Pina en la Sierra de Alcubierre.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de matorrales a baja altura en condiciones semiáridas. Florece desde junio hasta agosto.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Helianthemum squamati

Ononidetum tridentatae

Rosmarino officinali-Linetum suffruticosi

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

S. ilicifolia. Detalle del tallo



S. ilicifolia. Detalle del tallo y hojas



S. ilicifolia. Detalle de la hoja: haz

094 *Sideritis ilicifolia* Willd.



S. ilicifolia. Detalle de la hoja: envés



S. ilicifolia. Detalle de la inflorescencia



S. ilicifolia. Detalle de un verticilastro



S. ilicifolia. Detalle de la flor

094 *Sideritis ilicifolia* Willd.



S. ilicifolia. Detalle de la corola



S. ilicifolia. Detalle de las brácteas



S. ilicifolia. Detalle del cáliz tras la floración



S. ilicifolia. Detalle del cáliz