

**096 *Lathyrus cicera* L.**

Vireta, Pina de Ebro (23/04/2013)

***Lathyrus cicera* L.****NOMBRE VULGAR**

Almorta silvestre, chícharo, veza loca

**DESCRIPCIÓN**

10-40 cm. Hierba con tallos erectos, alados; hojas con peciolo y un par de folíolos, las inferiores con zarcillos simples y las superiores con zarcillos ramificados; flores de color rojizo; fruto con 3 a 6 semillas, elíptico.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**Familia Leguminosae**

Hojas divididas, rara vez simples.

Cáliz y corola diferenciados.

Corola con 5 pétalos, los dos inferiores soldados.

Sépalos generalmente soldados.

Ovario súpero

Estambres con sus filamentos soldados en tubo (rara vez libres), generalmente en número de 10.

Fruto en legumbre.

**Género *Lathyrus***

Planta sin espinas.

Estípulas de la hojas enteras.

Hojas con zarcillos.

Folíolos con nervios paralelos.

Dientes del cáliz desiguales, más cortos que el doble del tubo.

***Lathyrus cicera***

Planta anual.

Tallos alados.

Flores rojizas y solitarias, menores de 2 cm.

Todas las hojas con dos folíolos

Legumbre de 0,5 a 1 cm. de anchura

Legumbre con la sutura dorsal sin pelosidad y con dos quillas.

Legumbre con pedúnculo de 1 a 3 cm.

**ESPECIES SIMILARES**

El ser una hierba anual, tener el tallo alado, todas las hojas con dos folíolos, flores menores de 2 centímetros y de color rojo y frutos sin pelosidad y menores de un centímetro de anchura diferencian a esta especie de los demás *Lathyrus*.

**DISTRIBUCIÓN**

Región mediterránea, oeste y centro de Asia y Macaronesia. Presente en toda la Comarca.

**096 *Lathyrus cicera* L.****HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de campos de cultivo, orillas de caminos y pastizales, principalmente en ambientes de secano. Florece desde abril hasta junio.

**COMENTARIOS Y USOS**

Sus frutos verdes y los tallos tiernos se han utilizado como verduras, si bien el abuso en el consumo de las plantas de este género (las almorzas) puede producir neurolatirismo, con síntomas consistentes en rigidez en las piernas, calambres, diarreas y dolores intestinales. Se han citado estas afecciones en situaciones de hambruna, como en la postguerra española, con dietas extremadamente dependientes de estas legumbres.

Se ha llegado a cultivar como forraje y abonado en verde.

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**

*L. cicera*. Detalle del tallo alado.



*L. cicera*. Detalle de la hoja: haz



*L. cicera*. Detalle de la hoja: envés



*L. cicera*. Detalle del zarcillo en hoja inferior

**096 *Lathyrus cicera* L.**




*L. cicera*. Detalle del zarcillo en hoja superior



*L. cicera*. Detalle de la flor




*L. cicera*. Detalle de la corola



*L. cicera*. Detalle del cáliz

**096 *Lathyrus cicera* L.**



*L. cicera*. Detalle de las brácteas florales



*L. cicera*. Detalle del fruto