

100 *Althaea cannabina* L.

Contienda, Pina de Ebro (30/08/2017)

Althaea cannabina L.

NOMBRE VULGAR

Cañamera

DESCRIPCIÓN

50-150 cm. Planta con tallos erectos, ramificados, densamente tomentosos. Hojas profundamente palmatilobadas, con segmentos oblongos, dentados, las inferiores largamente pecioladas, las superiores con peciolo corto. Flores pentámeras, axilares, con pedicelos más largos que la hoja axilante; piezas del epicáliz más cortas que el cáliz, soldadas en la base; sépalos acuminados, pubescentes; pétalos truncados, rosados, con venas y uña purpúreas. Fruto discoideo.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Malvaceae

Hojas sin estípulas.

Flores con gineceo súpero.

Pétalos libres o ligeramente soldados en la base.

Estambres soldados por sus filamentos.

Cáliz generalmente rodeado por un epicáliz.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Género *Althaea*.**

Inflorescencia en panícula o racimo.

Flores menores de 6 cm, con pétalos de 8-32 cm.

Tubo estaminal cilíndrico, pubescente y cortamente papiloso.

Estambres hirsutos en los filamentos.

Epicáliz con 6 o más piezas, de lineares a oblongo-trianguulares, soldadas en la base.

Fruto achatado, formado por numerosos carpelos.

Althaea cannabina

Planta vivaz, bastante elevada (hasta 150 cm).

Indumento formado solo con pelos estrellados.

Hojas profundamente 3-5 palmatilobadas.

Pétalos mucho más largos que los sépalos.

Anteras purpúreas.

Mericarpos glabros, con costillas laterales.



A. cannabina: pétalos más largos que los sépalos y hoja muy lobulada.

ESPECIES SIMILARES

De las dos especies más del género *Althaea* presentes en la Comarca, *A. officinalis* tiene las hojas poco lobuladas y flor con peciolo menor que la hoja adyacente; *A. hirsuta* tiene las hojas divididas pero los pétalos son iguales o poco más largos que los sépalos.

100 *Althaea cannabina* L.



DISTRIBUCIÓN

Elemento euromediterráneo. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de juncales y herbazales sobre sustratos alterados y húmedos, con frecuencia en sotos o ribazos de campos de regadío. Florece desde julio hasta septiembre.



AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



A. officinalis: hojas poco lobuladas y flor con peciolo menor que la hoja adyacente



A. hirsuta: hojas divididas pero los pétalos son iguales o poco más largos que los sépalos.



A. cannabina. Detalle del tallo

100 *Althaea cannabina* L.



A. cannabina. Detalle de hoja inferior: haz



A. cannabina. Detalle de hoja superior: envés



A. cannabina. Detalle de hoja inferior: envés



A. cannabina. Detalle de la inflorescencia



A. cannabina. Detalle de hoja superior: haz



A. cannabina. Detalle de una flor

100 *Althaea cannabina* L.



A. cannabina. Detalle de la corola



A. cannabina. Detalle del cáliz cubriendo el fruto



A. cannabina. Detalle del cáliz y epicáliz



A. cannabina. Detalle de fruto maduro



A. cannabina. Detalle del cáliz cubriendo el fruto