

117 *Fumaria capreolata* L.

Deslinde, Pina de Ebro (24/04/2015)

Fumaria capreolata L.

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

20-80 cm. Planta habitualmente trepadora, sin vellosidad. Hojas alternas, pinnatisectas; últimas divisiones anchamente oblongas. Inflorescencias tan largas o más cortas que sus pedúnculos. Flores con pedicelos recurvados; 2 sépalos libres; 4 pétalos libres, blancos, a veces purpúreos en la madurez. Aquenios a menudo subcuadrangulares, un poco aquillados, lisos o algo rugosos hacia la quilla.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Papaveraceae

Plantas herbáceas, generalmente con látex.

Hojas generalmente alternas, sin estípulas.

Flores con gineceo súpero.

Flores con cáliz y corola manifiestos y diferentes.

Flores con 4 pétalos, iguales entre sí o desiguales.

Flores con pétalos libres o bien unos soldados y otros libres.

Flores con dos sépalos, que caen tempranamente.

Flores con número de estambres mayor que el doble de los pétalos.

Fruto capsular, que se abre en valvas o mediante poros.

Género *Fumaria*

Plantas anuales.

Últimos segmentos foliares lineares y/o multipartidos.

Inflorescencias en racimos laxos.

Flores en racimos largos y laxos, con pedicelos cortos y de longitud uniforme.

Flores blancas o rosadas, con pétalos desiguales. Con dos estambres.

Frutos globosos, esféricos u ovoideos o, si son comprimidos, con costillas longitudinales.

Fumaria capreolata

Pedúnculos fructíferos recurvados hacia atrás.


Segmentos foliares generalmente oblongos y planos, de más de 1,5 mm de anchura.

La mayoría de las flores de longitud mayor de 9 mm (espolón incluido).

Sépalos mayores de 1 mm de longitud.

Corola generalmente blanquecina.

Frutos mayores de 2,5 mm.



F. capreolata: flor de color blanco con pedúnculo curvado y hoja

117 *Fumaria capreolata* L.**ESPECIES SIMILARES**

El tener pedúnculos fructíferos recurvados hacia atrás, segmentos foliares oblongos y planos, la mayoría de las flores de longitud mayor de 9 mm y corola blanquecina, sépalos mayores de 1 mm de longitud y frutos mayores de 2,5 mm separan a esta especie de las demás del género *Fumaria* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Región euromediterránea. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de lugares húmedos apareciendo en la sombra de los árboles de ribera en los sotos. Florece desde abril hasta junio.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

F. capreolata. Detalle de la hoja: haz



F. capreolata. Detalle del tallo




F. capreolata. Detalle de la hoja: envés

117 *Fumaria capreolata* L.



F. capreolata. Detalle de la inflorescencia



F. capreolata. Detalle de la flor



F. capreolata. Detalle de las flores



F. capreolata. Detalle del fruto