117 *Hypecoum imberbe* Sm.

La Retuerta, Gelsa (13/04/2015)

***Hypecoum imberbe* Sm.**

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

10-40 cm. Planta con tallos sin vellosidad. Hojas basales pinnatisectas, sin vellosidad, con lóbulos lineares dilatados hacia el ápice. Inflorescencia con brácteas profundamente divididas. Sépalos lanceolados, denticulados. Con 4 pétalos anaranjado–amarillentos, los 2 externos trilobulados, los 2 internos tripartidos. Fruto mentáceo, estriado, estrecho, arqueado. Semillas de color pardo oscuro

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta
Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae
Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.
Flores generalmente con cáliz y corola.
Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones
Semillas con dos cotiledones.
Hojas con nervios ramificados.
Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Papaveraceae
Plantas herbáceas, generalmente con látex.
Hojas generalmente alternas, sin estípulas.
Flores con gineceo súpero.
Flores con cáliz y corola manifiestos y diferentes.
Flores con 4 pétalos, iguales entre sí o desiguales.
Flores con pétalos libres o bien unos soldados y otros libres.
Flores con dos sépalos, que caen tempranamente.
Flores con número de estambres mayor que el doble de los pétalos.
Fruto capsular, que se abre en valvas o mediante poros.

Género *Hypecoum*
Flores amarillas con pétalos con pétalos algo trilobulados, los internos diferentes a los externos.
Con 4 estambres.
Frutos lineares, alargados y provistos de tabiques, generalmente arqueados, con más de 2 cm de longitud.

Hypecoum imberbe
Flores y polen de color amarillo intenso.
Flores con lóbulos laterales de los pétalos externos tan grandes o más grandes que el lóbulo medio.
Frutos erguidos.

H. imberbe: flor de color amarillo intenso y fruto erguido

117 *Hypecoum imberbe* Sm.

ESPECIES SIMILARES

La otra especie del género *Hypecoum* presente en la Comarca es *H. pendulum* que tiene las flores de color amarillo pálido y frutos colgantes.



H. pendulum: flor de color amarillo pálido y fruto colgante

DISTRIBUCIÓN

Elemento mediterráneo. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de campos de secano y herbazales nitrófilos. Florece desde marzo hasta junio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Roemerio violaceae-Hypecoetum penduli

FAUNA ASOCIADA

Aeolothrips intermedius (Thysanoptera). Barrido
Aplocnemus consobrinus (Coleoptera). Barrido
Psilothrix viridicaerulea (Coleoptera). Barrido
Tenothrips discolor (Thysanoptera). Barrido

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

H. imberbe. Detalle del tallo

H. imberbe. Detalle de la hoja: haz

117 *Hypecoum imberbe* Sm.

H. imberbe. Detalle de la hoja: envés

H. imberbe. Detalle de la inflorescencia

H. imberbe. Detalle de botón floral

H. imberbe. Detalle de las brácteas

H. imberbe. Detalle de una flor

117 *Hypecoum imberbe* Sm.

H. imberbe. Detalle de la corola

H. imberbe. Detalle del fruto

H. imberbe. Detalle del cáliz y epicáliz

H. imberbe. Detalle del fruto