

117 *Papaver dubium* L.

Vireta, Pina de Ebro (01/05/2015)

Papaver dubium* L.*NOMBRE VULGAR**

Amapola, ababol

DESCRIPCIÓN

20-60 cm. Hierba uno o varios tallos simples, vellosos; hojas basales con peciolo, divididas; hojas superiores divididas, con segmentos agudos y aristados; flores solitarias, sobre largos pedúnculos; pétalos de color rojo claro, generalmente sin mancha; cápsula brevemente atenuada en la base, de color verde oscuro y con disco estigmático con 6 a 8 radios.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Papaveraceae**

Plantas herbáceas, generalmente con látex.

Hojas generalmente alternas, sin estípulas.

Flores con gineceo súpero.

Flores con cáliz y corola manifiestos y diferentes.

Flores con 4 pétalos, iguales entre sí o desiguales.

Flores con pétalos libres o bien unos soldados y otros libres.

Flores con dos sépalos, que caen tempranamente.

Flores con número de estambres mayor que el doble de los pétalos.

Fruto capsular, que se abre en valvas o mediante poros.

Género *Papaver*.

Látex no amarillo.

Flores con los pétalos iguales.

Flores con más de 10 estambres.

Fruto en forma de esfera, huevo o maza, menos de 10 veces más largas que anchas.

Fruto que se abre por pequeños agujeros apicales.

Papaver dubium

Hojas superiores no abrazadoras.

Pedúnculos de flores y frutos con pelosidad.



Flores con pétalos rojizos, generalmente sin mancha.

Flores con filamentos estaminales filiformes.

Cápsula sin pelosidad.

Cápsula con 6 a 8 radios en el disco estigmatífero.

Cápsula ovoide-cilíndrica, más del doble de larga que ancha.




P. dubium. Detalle de la corola, cápsula y disco estigmatífero.

117 *Papaver dubium* L.**ESPECIES SIMILARES**

Parecida a *Papaver rhoeas*, que tiene las hojas menos divididas, cápsula del fruto no más del doble de larga que ancha, pétalos generalmente con mancha oscura en la base y con 8 a 18 radios en el disco estigmatífero



P. rhoeas. Detalle de la corola, cápsula y disco estigmatífero.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**

P. dubium. Detalle del tallo

DISTRIBUCIÓN

Región mediterránea, Europa hasta Asia central e islas de Macaronesia. Presente en toda la Comarca, principalmente en ambientes de secano.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de campos de cultivo, orillas de caminos, pastizales y claros de bosque. Florece desde abril hasta julio.

COMENTARIOS Y USOS

Algunos fracasos en el uso medicinal de la amapola (*Papaver rhoeas*) se atribuyen a confusiones en la recolección debido a su parecido con esta especie.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.



P. dubium. Detalle de hoja inferior: haz

117 *Papaver dubium* L.



P. dubium. Detalle de hoja inferior: envés



P. dubium. Detalle del capullo floral



P. dubium. Detalle de hoja superior: haz



P. dubium. Detalle de la flor



P. dubium. Detalle de hoja superior: envés



P. dubium. Detalle de la corola

117 *Papaver dubium* L.



P. dubium. Detalle de la corola



P. dubium. Detalle del disco estigmatífero.



P. dubium. Detalle de la cápsula.



P. dubium. Detalle de la cápsula vacía