

117 *Platycapnos spicata* (L.) Bernh.

Vireta, Pina de Ebro (27/04/2013)

Platycapnos spicata* (L.) Bernh.*NOMBRE VULGAR**

Palomilla

DESCRIPCIÓN

5-30 cm. Hierba con hojas alternas, muy divididas; racimos subglobosos o elipsoidales, muy densos, con 15 a 60 flores; brácteas más largas que los pedicelos; sépalos libres; pétalos libres, rosados, con una mancha púrpura apical, el superior externo, con el margen amarillo y un espolón corto; estigma con apéndice apical bifurcado y recto; frutos aplanados.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Papaveraceae**

Plantas herbáceas, generalmente con látex.

Hojas generalmente alternas, sin estípulas.

Flores con gineceo súpero.

Flores con cáliz y corola manifiestos y diferentes.

Flores con 4 pétalos, iguales entre sí o desiguales.

Flores con pétalos libres o bien unos soldados y otros libres.

Flores con dos sépalos, que caen tempranamente.

Flores con número de estambres mayor que el doble de los pétalos.

Fruto capsular, que se abre en valvas o mediante poros.

Género *Platycapnos*

Hojas con divisiones muy numerosas, más o menos lineares.

Flores blancas o rosadas, con los pétalos desiguales.

Flores en espigas o racimos muy densos.

Flores con dos estambres.

Frutos aplanados.

Platycapnos spicata

Inflorescencia globosa, casi igual de ancha que de larga.

Flores de 5 a 7 mm.

Apéndice del estigma más o menos recto.



P. spicata. Detalle de la inflorescencia globosa y apéndice del estigma recto.

117 *Platycapnos spicata* (L.) Bernh.**ESPECIES SIMILARES**

Muy parecida a *Platycapnos tenuiloba*, que tiene la inflorescencia cilíndrica y el apéndice del estigma arqueado.



Platycapnos tenuiloba. Detalle de la inflorescencia cilíndrica y apéndice del estigma arqueado.

DISTRIBUCIÓN

Suroeste de Europa, norte de África y Macaronesia. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de claros de matorrales degradados, campos de cultivo y orillas de caminos, principalmente en ambientes de secano. Florece desde abril hasta junio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Agropyro cristati-Lygeetum sparti
Lygeo sparti-Stipetum lagascae
Ononidetum tridentatae

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

P. spicata. Detalle del tallo




P. spicata. Detalle de las hojas



P. spicata. Detalle de la inflorescencia

117 *Platycapnos spicata* (L.) Bernh.



P. spicata. Detalle de la flor



P. spicata. Detalle de la flor



P. spicata. Detalle de los frutos