

**121 *Limonium latebracteatum* Erben**

Miralrío, Gelsa (24/07/2013)

***Limonium latebracteatum* Erben****NOMBRE VULGAR**

-

**DESCRIPCIÓN**

15-40 cm. Planta perenne. Hojas en roseta, oblanceoladas, de color verdoso salpicado de blanco, con ápice agudo. Inflorescencia sin ramas estériles. Cáliz sobrepasando a la bráctea interna y tubo con indumento denso de pelos largos. Pétalos cuneiformes de color violáceo-rojizo claro.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**Familia Plumbaginaceae**

Hojas alternas o todas en roseta basal.

Flores sentadas, en capítulos o cimas espiciformes con frecuencia unilaterales.

Sépalos soldados.

Gineceo súpero terminado en varios estilos o estigmas.

**Familia Plumbaginaceae**

Estambres opuestos a los pétalos.

Anteras que se abren por hendiduras longitudinales.

Frutos monospermos, sin pico largo.

**Género *Limonium***

Hojas habitualmente reunidas en roseta basal.

Flores agrupadas en cimas ramificadas.

Cáliz no glandulosos, casi completamente escariosos.

Gineceo con 5 estilos.

Estambres unidos a la corola.

***Limonium latebracteatum***

Plantas perennes, con cepa algo leñosa, que al secarse conservan un color verde grisáceo.

Hojas y tallos verde azulados, salpicados de manchas blancas.

Hojas anchamente oblanceoladas o elípticas, de 2-4 cm de anchura y menos de 8 veces más largas que anchas y terminadas en un mucrón.

Apice foliar agudo, redondeado o escotado.

Inflorescencias sin ramas estériles (a veces con alguna rama inferior provista de espiguillas abortadas).

Bráctea interna no verrugosa.



*L. latebracteatum*:  
detalle de la hoja

**ESPECIES SIMILARES**

El ser planta perenne con cepa algo leñosa, que al secarse conserva un color verde grisáceo, tener hojas y tallos verde azulados, salpicados de manchas blancas, hojas anchamente elípticas, de 2-4 cm de anchura terminadas en un mucrón, inflorescencias sin ramas estériles (a veces con alguna rama inferior provista de espiguillas abortadas) y bráctea interna no verrugosa separan a esta especie de las demás del género *Limonium* citadas en la Comarca.

# 121 *Limonium latebracteatum* Erben



## DISTRIBUCIÓN

Endemismo de la mitad Este de la Península Ibérica. Encontrado en el barranco salado de Miralrío en Gelsa.

## HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos muy ricos en sales. Florece desde junio hasta agosto.

## RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

*Tamaricetum gallicae*  
*Salicornia herbacea-Suaeda fruticosa*  
*Suaedetum brevifoliae*  
*Limonietum ovalifolii*

## AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

## GALERÍA FOTOGRÁFICA



*L. latebracteatum*. Detalle de la hoja: haz



*L. latebracteatum*. Detalle del tallo



*L. latebracteatum*. Detalle de la hoja: envés



# 121 *Limonium latebracteatum* Erben



*L. latebracteatum*. Detalle de la inflorescencia



*L. latebracteatum*. Detalle del cáliz



*L. latebracteatum*. Detalle de rama fértil



*L. latebracteatum*. Detalle del cáliz



*L. latebracteatum*. Detalle de la flor



*L. latebracteatum*. Detalle del cáliz



*L. latebracteatum*. Detalle de la corola



*L. latebracteatum*. Detalle del cáliz