

131 *Adonis aestivalis* L.



Vireta, Pina de Ebro (23/04/2013)

Adonis aestivalis L.

NOMBRE VULGAR

Ojo de perdiz

DESCRIPCIÓN

20-60 cm. Planta con tallos simples o ramificados en la parte superior. Hojas alternas, con lóbulos lineares, las inferiores pecioladas, vellosas, las superiores sésiles. Flores solitarias, terminales; sépalos pelosos; pétalos rojos o amarillos, con mancha oscura en la base; estambres numerosos, de anteras negro violáceas. Fruto espiciforme, denso; aquenios con cresta transversal manifiesta y borde superior con pico largo, alejado de la giba.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Ranunculaceae

Plantas terrestres o acuáticas, en este caso enraizadas en el sustrato.

Gineceo súpero.

Flores con más de 12 estambres, con los filamentos libres entre sí.

Algunas especies con cáliz y corola en las flores, otras sólo con sépalos coloreados con apariencia de corola.

Estambres no soldados al cáliz, que caen pronto al madurar el fruto.

Flores con al menos algunos pétalos libres en su base, a veces con espolón o piezas en forma de casco.

Género *Adonis*

Tallo folioso, con todas las hojas similares.

Hojas multífidas divididas en segmentos lineares y repartidas por el tallo.

Flores solitarias, con dos envueltas más o menos iguales, no espolonadas.

Flores con 5-20 pétalos rojos o amarillos, sin fosas nectaríferas.

Pétalos sin foseta basal nectarífera.

Sépalos a menudo petaloideos.

Carpelos libres, pequeños, indehiscentes y monospermos.

Adonis aestivalis

Planta anual.

Sépalos adpresos a los pétalos.

Flores con menos de 10 pétalos, amarillos o rojos.

Anteras negro-violáceas.

Aquenios de 4-6 mm, con diente dorsal más o menos recto y saliente.

Aquenios maduros gibosos en el dorso y recurvados en el ápice.

Aquenios con la base dilatada, casi tan ancha como la parte media.



A. aestivalis. Detalle de la flor y aquenios

131 *Adonis aestivalis* L.

ESPECIES SIMILARES

Los aquenios con diente dorsal recto y saliente separan a esta especie de *A. microcarpa* con aquenios con diente aplicado al cuerpo y sépalos mucho más largos que los pétalos y de *A. flammea*, que tiene también aquenios con diente aplicado al cuerpo y sépalos más cortos que los pétalos.



A. microcarpa. Detalle de la flor y aquenios.



A. flammea. Detalle de la flor y aquenios.

DISTRIBUCIÓN

Elemento paleotemplado. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia principalmente de campos de secano y herbazales nitrófilos de sus alrededores. Florece desde mayo hasta julio.

COMENTARIOS Y USOS

Es una planta muy tóxica con propiedades cardiotónicas que sirven para el tratamiento de taquicardias y otras enfermedades cardíacas.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



A. aestivalis. Detalle del tallo y hoja



A. aestivalis. Detalle de la hoja: haz

131 *Adonis aestivalis* L.



A. aestivalis. Detalle de la hoja: envés



A. aestivalis. Detalle de la corola



A. aestivalis. Detalle del cáliz



A. aestivalis. Detalle de la flor



A. aestivalis. Detalle del fruto

131 *Adonis aestivalis* L.



A. aestivalis. Detalle del fruto