

131 *Ranunculus peltatus* Schrank.



Vireta, Pina de Ebro (23/04/2013)

***Ranunculus peltatus* Schrank**

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

20-80 cm. Planta con raíces numerosas, fibrosas. Tallos débiles, sin vellosidad. Hojas dimórficas o solamente capilares, con estípulas soldadas al peciolo parcialmente o hasta más de la mitad; las divididas en segmentos capilares sésiles o cortamente pecioladas; las laminares pecioladas, con limbo de lóbulos anchamente cuneados. Flores solitarias sobre pedúnculos; con 5 sépalos de ápice azulado; 5 pétalos blancos; estambres numerosos. Fruto globoso; aquenios glabros o con algunas cerdas en el ápice, con pico subterminal.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Ranunculaceae

Plantas terrestres o acuáticas, en este caso enraizadas en el sustrato.

Gineceo súpero.

Flores con más de 12 estambres, con los filamentos libres entre sí.

Algunas especies con cáliz y corola en las flores, otras sólo con sépalos coloreados con apariencia de corola.

Estambres no soldados al cáliz, que caen pronto al madurar el fruto.

Flores con al menos algunos pétalos libres en su base, a veces con espolón o piezas en forma de casco.

Género *Ranunculus*

Plantas terrestres o acuáticas.

Pétalos blancos o amarillos, con una pequeña escama o excavación en su base.

Flores sin espolones.

Frutos menores que las flores.

Carpelos muy numerosos, pequeños y libres.

Ranunculus peltatus

Planta acuática parcialmente sumergida.

Hojas superiores palmeadamente lobuladas y las inferiores divididas en segmentos lineares.



Flores blancas.

Pétalos de entre 5-20 mm.

Receptáculo alargado en la fructificación.

Frutos sin vellosidad.

Aquenios con costillas transversales.



R. peltatus. Detalle de la flor y aquenios

ESPECIES SIMILARES

El ser planta acuática, tener hojas superiores palmeadamente lobuladas y las inferiores divididas en segmentos lineares, flores blancas, pétalos de entre 5-20 mm, receptáculo alargado en la fructificación, frutos sin vellosidad y aquenios con costillas transversales separan a esta especie de las demás del género *Ranunculus* citadas en la Comarca.

131 *Ranunculus peltatus* Schrank.

DISTRIBUCIÓN

Elemento eurosiberiano. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de aguas quietas presente en la Comarca principalmente en las balsas del monte. Florece desde abril hasta junio.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



R. peltatus. Detalle de hoja superior: envés



R. peltatus. Detalle del tallo



R. peltatus. Detalle de hojas inferiores



R. peltatus. Detalle de hoja superior: haz



R. peltatus. Detalle de la flor

131 *Ranunculus peltatus* Schrank.



R. peltatus. Detalle de la corola



Balsa con *R. peltatus*



R. peltatus. Detalle del cáliz



R. peltatus. Detalle del fruto