

131 *Thalictrum tuberosum* L.



Vireta, Pina de Ebro (13/05/2013)

Thalictrum tuberosum L.

NOMBRE VULGAR

Ruibarbo

DESCRIPCIÓN

20-60 cm. Hierba con tallos erectos, simples; hojas casi todas agrupadas en la base, muy divididas, sin vellosidad; flores con sépalos blancos, mayores que los estambres; aquenios muy variables, con costillas longitudinales muy salientes.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Ranunculaceae

Plantas terrestres o acuáticas, en este caso enraizadas en el sustrato.

Gineceo súpero.

Flores con más de 12 estambres, con los filamentos libres entre sí.

Algunas especies con cáliz y corola en las flores, otras sólo con sépalos coloreados con apariencia de corola.

Estambres no soldados al cáliz, que caen pronto al madurar el fruto.

Flores con al menos algunos pétalos libres en su base, a veces con espolón o piezas en forma de casco.

Género *Thalictrum*

Con algunas hojas superiores.

Flores sin espolones, en grupos numerosos, con 4 ó 5 sépalos coloreados.

Frutos formados por aquenios numerosos, con costillas longitudinales marcadas.

Thalictrum tuberosum

Raíces tuberosas.

Hojas agrupadas en falsa roseta.

Sépalos blancos, más largos que los estambres.



Th. tuberosum. Flores con sépalos coloreados más largos que los estambres.

ESPECIES SIMILARES

Las raíces tuberosas, los sépalos blancos más largos que los estambres y las hojas agrupadas en falsa roseta diferencian a esta especie de las demás del género *Thalictrum*.

131 *Thalictrum tuberosum* L.

DISTRIBUCIÓN

Región mediterránea occidental (NE de la Península Ibérica y SE de Francia). Encontrado en la Sierra de Alcubierre, en Pina de Ebro.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Claros del pinar en sustratos pedregosos. Florece desde abril hasta junio.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



Th. tuberosum. Detalle de la flor



Th. tuberosum. Detalle de la hoja: haz



Th. tuberosum. Detalle de los sépalos y estambres



Th. tuberosum. Detalle de la hoja: envés



Th. tuberosum. Detalle de los sépalos

131 *Thalictrum tuberosum* L.



Th. tuberosum. Detalle de los achenios