

134 *Rosa micrantha* Borrer ex Sm.

Miralrío, Gelsa (18/05/2013)

***Rosa micrantha* Borrer ex Sm.**

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

1-3 m. Arbusto caducifolio, de tallos verdosos o rojizos, con agujones homogéneos. Hojas imparipinnadas, con 5–7 folíolos; folíolos de margen doblemente aserrado, de haz glabro o glabrescente y envés peloso y visiblemente glanduloso. Inflorescencias multifloras, rara vez flores solitarias. Flores pentámeras con sépalos reflejos y caducos, con la cara interna pelosa y la externa glandulosa; pétalos escotados, rosados; estambres numerosos; estilos libres, glabros, rara vez pelosos, unidos formando una unidad. Fruto subgloboso, glabro, rojo oscuro.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Rosaceae

A veces con espinas en tallos u hojas.

Hojas generalmente alternas, a veces en roseta basal.

Pétalos libres en su base, generalmente en igual número que los sépalos en las especies silvestres.

Estambres numerosos, 12 o más.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Rosaceae**

Filamento de los estambres libres entre sí.

A veces con estambres más o menos soldados a los sépalos y persistentes en el fruto.

Semillas ápteras.

Género *Rosa*

Arbustos espinosos, erguidos o trepadores.

Tallos con espinas formadas por estructuras independientes de las ramas, con frecuencia curvadas.

Hojas compuestas por folíolos independientes.

Fruto poliaquenio, rodeado del receptáculo carnoso (cinorrodon) y coloreado, coronado por los sépalos.

Rosa micrantha

Envés de las hojas con pelos glandulosos.

Folíolos anchos, más o menos redondeados en la base.

Espinas muy arqueadas.

Pedicelos florales glandulosos.

Sépalos reflejos, de dorso glanduloso y, habitualmente, caducos en el fruto.

Estilos libres, glabrescentes.



R. micrantha. Detalle del envés de la hoja, flor y frutos

134 *Rosa micrantha* Borrer ex Sm.**ESPECIES SIMILARES**

El tener el envés de las hojas con pelos glandulosos, folíolos anchos, más o menos redondeados en la base, espinas muy arqueadas, pedicelos florales glandulosos y sépalos reflejos, de dorso glanduloso y, habitualmente, caducos en el fruto separan a esta especie de las demás del género *Rosa* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Elemento eurosiberiano. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos húmedos y frescos por lo que aparece formando parte de la vegetación de los sotos. Florece desde mayo hasta julio.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

R. micrantha. Detalle del tallo



R. micrantha. Detalle de las espinas



R. micrantha. Detalle de la hoja: haz



R. micrantha. Detalle de la hoja: envés

134 *Rosa micrantha* Borrer ex Sm.



R. micrantha. Detalle de la inflorescencia



R. micrantha. Detalle de la corola



R. micrantha. Detalle del capullo floral



R. micrantha. Detalle del cáliz



R. micrantha. Detalle de la flor



R. micrantha. Detalle del fruto inmaduro

134 *Rosa micrantha* Borrer ex Sm.



R. micrantha. Detalle del fruto inmaduro



R. micrantha. Detalle del fruto maduro