

142 *Bartsia trixago* L.

Valtravesera, Pina de Ebro (06/07/2013)

Bartsia trixago* L.*NOMBRE VULGAR**

Gallocresta

DESCRIPCIÓN

20-40 cm. Hierba con tallos, erectos, simples o poco ramificados; hojas opuestas, lineares, remotamente aserradas; inflorescencia en forma de espiga, densa; brácteas con indumento muy denso, las inferiores foliáceas, las superiores enteras; flores con cáliz dividido en 2 labios laterales; corola bilabiada, blanca con tonos rosados o amarilla, con labio superior más largo que el cáliz; cápsula ovoidea, pelosa; semillas pardo claro, casi rosadas.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Scrophulariaceae**

Flores con pétalos soldados desde la base.

Flores con ovario súpero, no reunidas en capítulos.

Estambres en número igual o menor que el de los pétalos, generalmente alternos con ellos.

A veces filamentos de los estambres vellosos.

Género *Bartsia*

Hojas enteras, fuertemente dentadas.

Cáliz dividido en dos labios laterales bilobados.

Corola bilabiada, con el labio superior convexo.

Androceo con 4 a 8 estambres fértiles.

Cápsula no carnosa.

Bartsia trixago

Plantas anuales.

Flores con brácteas diferentes a las de las hojas.

Cáliz no regular, hendido hasta la mitad de su longitud definiendo dos lóbulos laterales dentados.

Corola con el labio inferior de mayor longitud que el superior.

Cápsula que no sobrepasa la longitud del cáliz.

Semillas estriadas longitudinalmente.



B. trixago. Detalle de los labios de la corola, cáliz y cápsula.

ESPECIES SIMILARES

La corola con el labio inferior más largo que el superior, el cáliz hendido hasta la mitad dejando dos lóbulos dentados y la cápsula que no sobrepasa la longitud del cáliz diferencian a esta especie de las demás del género *Bartsia*.

142 *Bartsia trixago* L.**DISTRIBUCIÓN**

Con probable origen en la región mediterránea, en la actualidad está extendida por todas las áreas tropicales y subtropicales del mundo. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de lugares secos donde aparece en barbechos, orillas de caminos y monterizas. Florece desde abril hasta junio.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

B. trixago. Detalle de hoja superior: haz



B. trixago. Detalle de hoja superior: envés



B. trixago. Detalle de hoja inferior: haz



B. trixago. Detalle de hoja inferior: envés



B. trixago. Detalle de inflorescencias

142 *Bartsia trixago* L.



B. trixago. Detalle de la flor



B. trixago. Detalle de rama con frutos



B. trixago. Detalle de la corola



B. trixago. Detalle de la cápsula



B. trixago. Detalle del cáliz

142 *Bartsia trixago* L.



B. trixago. Detalle de la cápsula