

142 *Verbascum boerhavii* L.

Vireta, Pina de Ebro (22/06/2013)

***Verbascum boerhavii* L.**

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

50-150 cm. Planta con tallos tomentosos. Hojas basales ovadas u ovado-elípticas, de haz glabrescente y envés tomentoso de un verde grisáceo. Flores pentámeras; cáliz con segmentos linear-lanceolados, enteros; corola rotácea; Cápsula ovoide

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Scrophulariaceae

Flores con pétalos soldados desde la base.

Flores con ovario súpero, no reunidas en capítulos.

Estambres en número igual o menor que el de los pétalos, generalmente alternos con ellos.

A veces filamentos de los estambres vellosos.

Género *Verbascum*

Plantas erectas.

Hojas alternas.

Corola con 5 pétalos amarillos, de tubo más corto que los lóbulos y el cáliz.

Flores con 5 estambres exsertos, al menos algunos densamente vellosos.

Verbascum boerhavii

Planta erecta, simple o poco ramificada y cubierta de pubescencia corta, grisácea y caediza.

Hojas basales ovadas, con pecíolo de 4-8 cm, las caulinares sésiles.

Hojas basales dentadas o crenadas, glabrescentes y de un verde oscuro por el haz, tomentosas y de un verde ceniciento por el envés.

Flores reunidas en inflorescencia espiciforme poco densa.

Filamentos de los estambres todos similares, los dos inferiores con anteras decurrentes sobre el filamento.

Brácteas de 1-2,5 cm de longitud.

Cápsula ovoidea, poco más larga que el cáliz.



V. boerhavii. Hojas basales dentadas, glabrescentes por el haz; estambres con pelos violáceos, los inferiores con pelos en el tercio inferior; pedicelos en la fructificación netamente más cortos que la cápsula que es ovoidea, poco más larga que el cáliz

142 *Verbascum boerhavii* L.



ESPECIES SIMILARES

El tener hojas basales dentadas, glabrescentes y de un verde oscuro por el haz y tomentosas y de un verde ceniciento por el envés, estambres con pelos violáceos, los inferiores con pelos en el tercio inferior y pedicelos en la fructificación netamente más cortos que la cápsula, que es ovoidea y poco más larga que el cáliz separan a esta especie de las demás del género *Verbascum* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Elemento mediterráneo occidental. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de terrenos removidos o pastoreados, cunetas, ribazos y pastizales secos. Florece desde mayo hasta julio.

COMENTARIOS Y USOS

En el alto Aragón se utiliza el cocimiento de hojas frescas para tratar el mal de garganta; debe utilizarse en gargarismos con cuidado de no beberlo so pena de “ponerse uno muy malo”.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



V. boerhavii. Detalle del tallo



V. boerhavii. Detalle de hoja inferior: haz



V. boerhavii. Detalle de hoja inferior: envés

142 *Verbascum boerhavii* L.



V. boerhavii. Detalle de hoja superior: haz



V. boerhavii. Detalle de la flor



V. boerhavii. Detalle de hoja superior: envés



V. boerhavii. Detalle de la corola



V. boerhavii. Detalle del cáliz

142 *Verbascum boerhavii* L.



V. boerhavii. Detalle de fruto inmaduro



V. boerhavii. Detalle de fruto maduro