

142 *Verbascum sinuatum* L.

Deslinde, Pina de Ebro (26/06/2013)

Verbascum sinuatum* L.*NOMBRE VULGAR**

Gordolobo cenicero

DESCRIPCIÓN

40-100 cm. Planta con tallos pubescentes. Hojas basales irregularmente pinnatilobadas, con los lóbulos desiguales y gruesamente dentados, tomentosas por ambas caras. Inflorescencia paniculiforme, de eje tomentoso. Flores pentámeras; cáliz con segmentos triangulares, enteros; estambres con pelos violáceos en los filamentos. Cápsula subglobosa.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Scrophulariaceae**

Flores con pétalos soldados desde la base.

Flores con ovario súpero, no reunidas en capítulos.

Estambres en número igual o menor que el de los pétalos, generalmente alternos con ellos.

A veces filamentos de los estambres vellosos.

Género *Verbascum*

Plantas erectas.

Hojas alternas.

Corola con 5 pétalos amarillos, de tubo más corto que los lóbulos y el cáliz.

Flores con 5 estambres exertos, al menos algunos densamente vellosos.

Verbascum sinuatum

Hojas basales con el margen ondulado y profusamente recortado.

Inflorescencia muy ramificada, laxa y algo glandulosa.

Flores reunidas en grupos axilares numerosos.

Pedicelos más cortos que el cáliz.

Filamentos estaminales con pelos violáceos que, a veces bajo la antera, pueden ser amarillentos.



V. sinuatum. Hojas basales con el margen ondulado; estambres con pelos violáceos; pedicelos en la fructificación netamente más cortos que la cápsula que es subglobosa, poco más larga que el cáliz

142 *Verbascum sinuatum* L.**ESPECIES SIMILARES**

El tener hojas basales con el margen ondulado y profusamente recortado, inflorescencia muy ramificada, laxa y algo glandulosa, flores reunidas en grupos axilares numerosos, pedicelos más cortos que el cáliz y filamentos estaminales con pelos violáceos que, a veces bajo la antera, pueden ser amarillentos separan a esta especie de las demás del género *Verbascum* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Elemento euromediterráneo irano-turaniano. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de comunidades nitrófilas de orillas de caminos, terrenos baldíos y alrededores de lugares frecuentados por el ganado. Florece desde junio hasta agosto.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

V. sinuatum. Detalle del tallo con hoja superior



V. sinuatum. Detalle del tallo



V. sinuatum. Detalle de hoja inferior: haz



V. sinuatum. Detalle de hoja inferior: envés

142 *Verbascum sinuatum* L.



V. sinuatum. Detalle de hoja superior: haz



V. sinuatum. Detalle de la flor



V. sinuatum. Detalle de hoja superior: envés



V. sinuatum. Detalle de la corola



V. sinuatum. Detalle del cáliz

142 *Verbascum sinuatum* L.



V. sinuatum. Detalle de fruto inmaduro



V. sinuatum. Detalle del fruto



V. sinuatum. Detalle del fruto