

142 *Veronica polita* Fries

Deslinde, Pina de Ebro (25/05/2013)

Veronica polita Fries

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

5-30 cm. Planta pelosa, con tallos procumbentes, ramificados desde la base. Hojas ovales, profundamente dentadas, pecioladas. Racimo terminal, con 5-30 flores, muy laxo; pedicelos que igualan o sobrepasan a las brácteas, en general recurvados en la madurez. Flores tetrámeras; sépalos anchamente ovales; corola azul con garganta más clara; con 2 estambres. Cápsula poco comprimida, con lóbulos paralelos, densamente pubescente, con abundantes pelos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Scrophulariaceae

Flores con pétalos soldados desde la base.

Flores con ovario súpero, no reunidas en capítulos.

Estambres en número igual o menor que el de los pétalos, generalmente alternos con ellos.

A veces filamentos de los estambres vellosos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Género *Veronica*

Hojas opuestas, al menos las basales.

Flores azuladas o blanquecinas.

Flores con 4 pétalos y 2 estambres.

Corola con simetría radiada, con tubo muy corto.

Cápsulas escotadas en el ápice.

Veronica polita

Hojas ovaladas, regularmente dentadas, con peciolo mucho más corto que el limbo.

Racimos florales no claramente separados de la región foliar.

Flores solitarias en la axila de las hojas.

Corola azul intenso.

Cápsula globosa, con pelos glandulares largos y no glandulares cortos.

Cápsula con lóbulos paralelos y seno agudo.



V. polita. Hojas ovaladas, regularmente dentadas, con peciolo mucho más corto que el limbo, flores solitarias con corola azul intenso y cápsula globosa, pelosa, con lóbulos paralelos y seno agudo

ESPECIES SIMILARES

El tener hojas ovaladas, regularmente dentadas, con peciolo mucho más corto que el limbo, flores solitarias en la axila de las hojas, de color azul intenso y cápsula globosa, con pelos glandulares largos y no glandulares cortos y lóbulos paralelos y seno agudo separan a esta especie de las demás del género *Veronica* citadas en la Comarca.

142 *Veronica polita* Fries



DISTRIBUCIÓN

Elemento subcosmopolita. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de medios húmedos y ruderalizados por lo que aparece frecuentemente en huertos y campos de regadío. Florece desde abril hasta septiembre.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

- Agropyro cristati-Lygeetum sparti*
- Carduo pycnocephali-Hordeetum leporini*
- Lygeo sparti-Stipetum lagascae*
- Onopordetum nervosi*
- Roemerio violaceae-Hypecoetum penduli*
- Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae*
- Salsolo vermiculatae-Pegonetum harmalae*


AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



V. polita. Detalle del tallo con hojas e inflorescencia



V. polita. Detalle del tallo



V. polita. Detalle de la hoja: haz

142 *Veronica polita* Fries



V. polita. Detalle de la hoja: envés



V. polita. Detalle del cáliz



V. polita. Detalle de la flor



V. polita. Detalle del fruto



V. polita. Detalle de la corola

142 *Veronica polita* Fries



V. polita. Detalle del fruto



V. polita. Detalle del fruto



V. polita. Detalle del fruto