145 *Tamarix boveana* Bunge

Laguna de Piñol, Sástago (19/04/2013)

***Tamarix boveana* Bunge**

NOMBRE VULGAR
Tamariz

DESCRIPCIÓN
1-4 m. Arbusto con ramas pardas o rojizas; hojas de 2 a 4 mm; racimos florales de 7-12 mm de ancho, generalmente en ramas leñosas de años anteriores; brácteas más largas que el cáliz; flores generalmente con 4 pétalos; cáliz con sépalos desiguales.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
División Spermatophyta
Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae
Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.
Flores generalmente con cáliz y corola.
Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Dicotyledones
Semillas con dos cotiledones.
Hojas con nervios ramificados.
Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Tamaricaceae
Árboles o arbustos
Hojas diminutas, escuamiformes.
Flores rosadas o blancas, en espiga, con 4 ó 5 pétalos libres en su base.
Flores con número de estambres menor al doble de los pétalos.
Flores con gineceo súpero

CLAVES DE DETERMINACIÓN
Género *Tamarix*
Hojas triangular-escuamiformes.
Flores con 3 a 6 estilos.
Flores con cáliz de unos 2 mm de longitud.
Inflorescencia de hasta 8 mm de grosor.

Tamarix boveana
Ramas pardas o rojizo-pardo.
Hojas grandes, de 3 a 6 mm.
Flores con 4 pétalos y cuatro sépalos.
Brácteas de las flores más largas que el cáliz.
Racimos florales de 7-12 mm de anchura, generalmente dispuestos en ramas viejas de años anteriores.



T. boveana. Detalle de racimo floral y flor con 4 pétalos.

ESPECIES SIMILARES
Fuera de la floración las plantas del género *Tamarix* son muy difíciles de determinar. *T. boveana* puede diferenciarse con facilidad de *Tamarix canariensis* y *Tamarix gallica*, porque estas últimas tienen siempre sus inflorescencias en ramas finas del año y flores con 5 pétalos. *Tamarix africana* tiene también las inflorescencias en ramas viejas, pero con flores con 5 pétalos.



T. africana. Detalle de rama vieja con racimos florales y flor con 5 pétalos.

145 *Tamarix boveana* Bunge

T. canariensis. Detalle de rama del año con racimos florales y flor con 5 pétalos.

T. gallica. Detalle de rama del año con racimos florales y flor con 5 pétalos.

DISTRIBUCIÓN

Norte de África, este de la Península Ibérica e Islas Baleares. En la Comarca se conoce sólo de la Laguna de Piñol (Sástago).

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de suelos húmedos con salinidad. Florece desde marzo hasta junio.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

T. boveana. Detalle del tronco.

T. boveana. Detalle de una rama.

T. boveana. Detalle de una rama joven

T. boveana. Detalle de una rama con hojas

T. boveana. Detalle de las hojas

145 *Tamarix boveana* Bunge

T. boveana. Detalle de las hojas

T. boveana. Detalle de rama con racimos florales

T. boveana. Detalle de un racimo floral

T. boveana. Detalle de las flores

T. boveana. Detalle de una flor

T. boveana. Detalle de rama con racimos fructificados

145 *Tamarix boveana* Bunge

T. boveana. Detalle de un racimo fructificado

T. boveana. Detalle de un racimo con frutos y semillas

T. boveana. Detalle de rama con racimos con frutos y semillas