

# 152 *Ammi majus* L.



Rebollar, Pina de Ebro (28/06/2013)

*Ammi majus* L.

**NOMBRE VULGAR**

Ameo

**DESCRIPCIÓN**

20-60 cm. Hierba sin vello, con tallos estriados; hojas muy divididas, con segmentos variables y aserrados, con peciolo envainador; umbelas compuestas con 20-55 radios no convergentes en la fructificación; de 5 a 20 brácteas muy divididas, con margen escarioso; bractéolas enteras y numerosas; flores con pétalos blancos; frutos comprimidos lateralmente, sin vello, mericarpos con las 5 costillas primarias prominentes.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN**

**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN**

**Subclase Dicotyledones**

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

**Familia Umbelliferae**

Hojas con frecuencia lobuladas o divididas, generalmente envolventes.

A veces con perianto simple o ausente; si está presente, entonces flores con 6 pétalos o menos, libres o ligeramente soldados en la base.

Las flores están en pedúnculos que arrancan de un mismo punto y alcanzan la misma altura (umbela).

Flores con gineceo ínfero y menos de 10 estambres.

Frutos secos, que se separan en dos partes en la madurez.

**Género *Ammi***

Plantas anuales con raíces tenues.

Tallos y hojas verdes, sin manchas rojizas.

Hojas superiores con segmentos estrechos, menores de 5 mm.

Hojas inferiores varias veces divididas.

Brácteas numerosas profundamente dentadas.

Umbela de entre 20 a 80 radios.

Frutos lisos, sin alas ni agujones.

***Ammi major***

Hojas inferiores con segmentos dentados que superan 1 mm de anchura.

Umbelas por lo general con menos de 60 radios, no convergentes en la fructificación.



*A. majus*. Detalle de las brácteas divididas y umbela con radios no convergentes en la fructificación

**152 *Ammi majus* L.****GALERÍA FOTOGRÁFICA**

*A. majus*. Detalle de los segmentos dentados y anchos de las hojas inferiores y fruto sin alas ni aguijones.

**ESPECIES SIMILARES**

El fruto comprimido sin alas ni aguijones y las brácteas muy divididas diferencian a esta especie de las demás de la familia Umbelliferae; las hojas inferiores con segmentos dentados y mayores de 1 mm y los radios de la umbela no convergentes en la fructificación la diferencian de las demás del género *Ammi*.

**DISTRIBUCIÓN**

Región mediterránea y este de Asia. Presente en toda la Comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de campos de cultivo, orillas de caminos y lugares con suelos alterados, principalmente en ambientes de regadío. Florece desde mayo hasta julio.

**COMENTARIOS Y USOS**

El jugo de esta especie acelera el bronceado, pero no se recomienda su uso por ser peligroso al poseer 8-metoxipsoraleno y provocar fotosensibilidad en la piel

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.



*A. majus*. Detalle del tallo



*A. majus*. Detalle de hoja superior: haz



**152 *Ammi majus* L.**



*A. majus*. Detalle de hoja superior: envés



*A. majus*. Detalle de segmentos en hoja inferior.



*A. majus*. Detalle de hoja inferior: haz



*A. majus*. Detalle de umbela con flores



*A. majus*. Detalle de hoja inferior: envés



*A. majus*. Detalle de umbela con flores



**152 *Ammi majus* L.**



*A. majus*. Detalle de brácteas y radios de la umbela con flores



*A. majus*. Detalle de umbela con frutos



*A. majus*. Detalle de las flores



*A. majus*. Detalle de brácteas y radios de la umbela con frutos



*A. majus*. Detalle de umbela con frutos


**152 *Ammi majus* L.**



*A. majus*. Detalle de los frutos



*A. majus*. Detalle de los frutos



*A. majus*. Detalle del fruto