

154 *Valerianella coronata* (L.) DC.



Val de Abellera, Pina de Ebro (07/04/2015)

Valerianella coronata (L.) DC.

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

5-25 cm. Planta con tallos ramificados, raramente simples. Hojas glabrescentes, a menudo laxamente ciliadas o pelosas en los márgenes. Inflorescencia con ramas culminadas por cimas globosas. Flores pentámeras. Cáliz persistente en el fruto. Corola con tubo apenas giboso, blanquecino, y lóbulos subiguales, rosados o de un azul violáceo. Aquenios con 3 lóbulos desarrollados, uno fértil y 2 estériles, a veces densamente pelosos pero generalmente glabrescentes.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Subclase Dicotyledones

Semillas con dos cotiledones.

Hojas con nervios ramificados.

Parte externa de la flor con piezas florales con un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Familia Valerianaceae

Plantas anuales,

Hojas opuestas.

Flores reunidas en grupos numerosos, con estambres salientes en número de 1 a 3.

Piezas de la flor soldadas en un tubo, a veces sinuoso o espolonado.

Flores con gineceo ínfero.

Género *Valerianella*

Plantas anuales.

Flores con 2-4 estambres.

Corola sin espolón.

Cáliz membranoso, con dientes no plumosos.

Valerianella coronata

Brácteas florales anchas, ovales.

Cáliz fructífero dividido hasta la mitad en 6 dientes.

Frutos doble de largo que de anchos, reunidos en glomérulos esféricos.

Fruto densamente peloso, con cáliz persistente en forma de corona reticulada.



V. coronata. Detalle de la flor y el fruto.

ESPECIES SIMILARES

El tener brácteas florales anchas y ovales, cáliz fructífero dividido hasta la mitad en 6 dientes y frutos doble de largo que de anchos reunidos en glomérulos esféricos separan a esta especie de las demás del género *Valerianella* citadas en la Comarca.

154 *Valerianella coronata* (L.) DC.



DISTRIBUCIÓN

Elemento paleotemplado. Presente en toda la comarca en ambientes esteparios.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Forma parte de los pastizales anuales que se instalan en los claros entre matorrales arbustivos y espartales en suelos secos y soleados. Florece desde abril hasta junio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

Eremopyreto-Lygeetum

Lygeo sparti-Stipetum lagascae

Helianthemetum squamati

Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae

Suaedetum verae

COMENTARIOS Y USOS

Las hojas son comestibles y pueden consumirse como ensalada.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



V. coronata. Detalle de hoja inferior: haz



V. coronata. Detalle del talo



V. coronata. Detalle de hoja inferior: envés

154 *Valerianella coronata* (L.) DC.



V. coronata. Detalle de hoja superior: haz



V. coronata. Detalle de la inflorescencia



V. coronata. Detalle de la inflorescencia



V. coronata. Detalle de hoja superior: envés



V. coronata. Detalle de la flor

154 *Valerianella coronata* (L.) DC.



V. coronata. Detalle de los frutos



V. coronata. Detalle de los frutos