

162 *Sternbergia colchiciflora* Waldst. & Kit.

Retuerta de Pina, Pina de Ebro (27/09/2017)

***Sternbergia colchiciflora* Waldst. & Kit.**

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

5-20 cm. Bulbo con túnicas pardo oscuras que se prolongan a lo largo del escapo; escapo solitario; hojas lineares, planas, enteras, la más externa membranácea y envolvente, blanco amarillenta; flores trímeras, solitarias; espata de una sola pieza, blanco amarillenta, que alcanza la base de los lóbulos del perianto; perianto campanulado, amarillo, prolongado en tubo; con 6 estambres insertos en la base de los tépalos; cápsula globosa.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Monocotyledones

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Amaryllidaceae**

Plantas con bulbo, todas las hojas basales.

Flores con pétalos coloreados.

Flores con 6 estambres, con frecuencia con paracorola.

Flores con gineceo ínfero.

Hojas sentadas y paralelinervias.

Género *Sternbergia*. *Sternbergia colchiciflora*

Perianto sin corona.

Tubo del perianto con más de 10 mm.

Flores amarillas.

Tépalos soldados en la base.

Limbo de los tépalos de 3–5 mm de anchura, lineares.

ESPECIES SIMILARES

En Aragón no es posible confundir esta especie con ninguna otra de la familia Amaryllidaceae.

DISTRIBUCIÓN

Elemento pónico-mediterráneo. Es una especie muy rara encontrada en la Retuerta de Pina (Pina de Ebro).

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de pastizales secos sobre suelos margosos; la población de la Retuerta ha sido encontrada vegetando en el suelo muy pisoteado de una trocha hecha por los ciervos. Florece en septiembre-octubre y fructifica desde febrero hasta mayo.

COMENTARIOS Y USOS

Especie que suele pasar desapercibida debido a que tiene una floración efímera (la flor dura uno o dos días) tardo-estival y otoñal. Se ha comprobado que si las precipitaciones no son suficientes, puede incluso no florecer, por lo que puede pasar varios años en estado vegetativo, o florecer de forma cleistógama (la flor no se abre por lo que ella misma se autopoliniza y se autofecunda).

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

162 *Sternbergia colchiciflora* Waldst. & Kit.



GALERÍA FOTOGRÁFICA



S. colchiciflora. Detalle de las hojas



S. colchiciflora. Detalle del fruto



S. colchiciflora. Detalle del fruto