

**162 *Sternbergia colchiciflora* Waldst. & Kit.**

Retuerta de Pina, Pina de Ebro (27/09/2017)

***Sternbergia colchiciflora* Waldst. & Kit.**

**NOMBRE VULGAR**

-

**DESCRIPCIÓN**

5-20 cm. Bulbo con túnicas pardo oscuras que se prolongan a lo largo del escapo; escapo solitario; hojas lineares, planas, enteras, la más externa membranácea y envolvente, blanco amarillenta; flores trímeras, solitarias; espata de una sola pieza, blanco amarillenta, que alcanza la base de los lóbulos del perianto; perianto campanulado, amarillo, prolongado en tubo; con 6 estambres insertos en la base de los tépalos; cápsula globosa.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Monocotyledones**

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Familia Amaryllidaceae**

Plantas con bulbo, todas las hojas basales.

Flores con pétalos coloreados.

Flores con 6 estambres, con frecuencia con paracorola.

Flores con gineceo ínfero.

Hojas sentadas y paralelinervias.

**Género *Sternbergia*. *Sternbergia colchiciflora***

Perianto sin corona.

Tubo del perianto con más de 10 mm.

Flores amarillas.

Tépalos soldados en la base.

Limbo de los tépalos de 3–5 mm de anchura, lineares.

**ESPECIES SIMILARES**

En Aragón no es posible confundir esta especie con ninguna otra de la familia Amaryllidaceae.

**DISTRIBUCIÓN**

Elemento pónico-mediterráneo. Es una especie muy rara encontrada en la Retuerta de Pina (Pina de Ebro).

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de pastizales secos sobre suelos margosos; la población de la Retuerta ha sido encontrada vegetando en el suelo muy pisoteado de una trocha hecha por los ciervos. Florece en septiembre-octubre y fructifica desde febrero hasta mayo.

**COMENTARIOS Y USOS**

Especie que suele pasar desapercibida debido a que tiene una floración efímera (la flor dura uno o dos días) tardo-estival y otoñal. Se ha comprobado que si las precipitaciones no son suficientes, puede incluso no florecer, por lo que puede pasar varios años en estado vegetativo, o florecer de forma cleistógama (la flor no se abre por lo que ella misma se autopoliniza y se autofecunda).

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

# 162 *Sternbergia colchiciflora* Waldst. & Kit.

## GALERÍA FOTOGRÁFICA



*S. colchiciflora*. Detalle de las hojas



*S. colchiciflora*. Detalle del fruto



*S. colchiciflora*. Detalle del fruto